編　　號：185

大花蔓陀羅

科　　名：茄科(Solanaceae)

學　　名：*Datura suaveolens* Humb & Bonpl ex Willd.

生育特徵：多年生草本，葉橢圓羽狀淺裂，大管狀花，蒴果。性喜乾濕適中陽光足之地。

繁殖方法：實生法繁殖、分枝、扦插繁殖法。

利用部位：花。

主要成分：洋金花素。

功　　效：葉治哮喘，花治喘息、腫瘤、火傷、痙攣。具止痛效果及解毒作用。

產　　地：新竹。

編　　號：186

通草

別　　名：通脫木、花草

科　　名：五加科(Araliaceae)

學　　名：*Tetrapanax papyriferus* (Hook.) Koch

生育特徵：多年生灌木、葉呈掌狀葉。莖中有髓。開白花。性喜乾濕適中陽光足之地。

繁殖方法：分枝繁殖法。

利用部位：花、全株。

主要成分：通草素。

功　　效：髓利尿、清涼、解熱、鎮靜、水腫、淋病癃閉、乳少，花治惡瘡、痔疾、頸部淋巴腺結核。

產　　地：新竹。

編　號：187

防葵

別　名：台灣防風、房苑
牡丹防風、食用防風
防風
科　名：繖形科(Umbelliferae)
學　名：*Peucedanum japonicum* Thunb.
生育特徵：多年生草本，葉掌狀淺裂，繖形花序，白色花，種子小。性幸喜乾溼適中陽光足之地。
繁殖方法：分枝法、實生法繁殖。
利用部位：根。
主要成分：防風素、香油。
功　效：根治感冒、咳嗽、痛風、膀胱、腸疾患。
產　地：台灣野生、新竹。

編　號：188

康福利

別　名：康復力
科　名：紫草科(Boraginaceae)
學　名：*Sympytum officinale* Linn.
生育特徵：多年生草本，葉呈卵狀披針形，莖部葉叢生，互生。開白、黃、紫等花色，果為四分果。
繁殖方法：分枝繁殖法。
利用部位：全草。
主要成分：維生素 B12。
功　效：葉補血、止瀉之效。止痢、防癌、富維生素 B12，哮喘。治出血、瀉痢、高血壓、抗癌。
產　地：台灣、新竹、日本。

編　號：189

過山香

別　名：番仔香草、龜裡椹
假黃皮樹、雞母黃
山黃皮、小葉臭黃皮
科　名：芸香科(Rutaceae)
學　名：*Clausena excavata* Burm.f.
生育特徵：多年生灌木或小喬木，葉為羽狀複葉，小葉披針形。圓錐花序，頂生，開黃花，核果。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：根、葉。
主要成分：生物鹼、精油。
功　效：根治蛇傷、腹痛、跌打損傷、風濕痹痛。葉為外用瘡癤。
產　地：台灣野生、新竹。

編　號：190

石菖蒲

別　名：堯韭、水劍草、石蜈蚣
菖蒲葉、香菖蒲
劍葉菖蒲、苦菖蒲
科　名：天南星科(Araceae)
學　名：*Acorus gramineus* Soland.
生育特徵：多年生草本，葉披針形，自莖基部抽出花穗，開白色花。性喜潮濕陽光地。
繁殖方法：分枝繁殖法。
利用部位：根、莖。
主要成分：菖蒲素。
功　效：清涼性健胃驅風藥，鎮痛、鎮靜、驅風、婦女腰冷、腹痛、腹脹。
產　地：新竹。

編　　號：191

苦蘵

別　　名：泡泡草、燈籠摶仔草、燈籠草
　　　　　砲仔草、白厚朴、鬼燈籠、天泡草
科　　名：茄科(Solanaceae)
學　　名：*Physalis angulata* Linn
生育特徵：一年生或二年生草本 葉橢圓形，開白花，果熟時壓時有聲。性喜潮濕陽光地。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：全株。
主要成分：泡泡草素。
功　　效：全草治熱煩滿、定志益氣、利水道。治黃病、上氣咳嗽、風熱明目、疝氣、跌打紅腫、婦女赤白帶。果實治煩熱、難產、黃病、骨蒸勞熱。
產　　地：新竹。



編　　號：192

白鳳豆

別　　名：白關刀豆、刀豆
　　　　　洋刀豆、白刀豆
科　　名：豆科(Leguminosae)
學　　名：*Canavalia ensiformis* DC.
生育特徵：多年生草本，葉心形；粉紅色花；莢果。性喜乾濕陽光足之地。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：種子、根。
主要成分：白鳳豆素。
功　　效：強壯、祛痰、痛風。
產　　地：新竹。

落地生根

編　號：193
別　名：倒吊蓮、倒地蓮、燈籠花
科　名：景天科(Crassulaceae)
學　名：*Bryophyllum pinnatum* (Lam.) Kurz.
生育特徵：多年生草本，葉卵形或橢圓形，開黃色花，蒴果。性喜乾濕適中陽光足之地。
繁殖方法：扦插繁殖法。
利用部位：全株。
主要成分：植物鹼。
功　效：散風清血、消腫毒、退癀熱、癰疽熱毒、蜂巢癰痛、跌打蛇傷、風熱、刀傷、水腫、肺炎。
產　地：新竹。

返魂草

編　號：194
別　名：雞爪癀、大翻魂、大返魂草
科　名：景天科(Crassulaceae)
學　名：*Kalanchoe gracilis* Hance
生育特徵：多年生草本，羽狀複葉，小葉披針形至線形，開黃色花。性喜乾旱陽光足之地。
繁殖方法：扦插繁殖法。
利用部位：葉。
主要成分：植物鹼。
功　效：跌打損傷。
產　地：新竹。

編　　號：195

黑豆

別　　名：烏豆
科　　名：豆科(Leguminosae)
學　　名：*Glycine max* (Linn) Merrill (*Glycine soja* (L.) Z).
生育特徵：一年生或二年生草本，葉披針形；種子黑色。性喜乾旱陽光足之地。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：種子。
主要成分：植物鹼。
功　　效：補腎營養、治腎病、利水下氣活血。
產　　地：新竹。

編　　號：196

菊芋

別　　名：菊藷、天山雪蓮藷
科　　名：菊科(Compositae)
學　　名：*Helianthus tuberosus* L.
生育特徵：多年生草本，葉心形；根莖肥大；黃花，管狀花序。性喜冷涼且乾濕適中陽光足之地。
繁殖方法：塊莖繁殖法。
利用部位：幹、塊根、花。
主要成分：澱粉、醣類。
功　　效：幹或塊根消炎解毒。治癰腫毒瘡、青春痘、急性肝炎。花製茶清香可口、清涼解渴。
產　　地：新竹。

白蓮蕉

編　號：197
別　名：白花蓮蕉
白花美人蕉
白花蓮蕉頭
科　名：曇華科(Cannaceae)
學　名：*Canna indica* Linn
生育特徵：多年生草本，根莖肥大，葉廣橢圓形，白花，蒴果。性喜乾濕適中陽光足之地。
繁殖方法：塊莖、實生法繁殖。
利用部位：根、莖、葉。
主要成分：白蓮蕉皂。
功　效：消腫、清熱、治淋巴腺腫瘤、高血壓、搗敷腫毒。
產　地：新竹。

黃花野百合

編　號：198
別　名：豬屎豆、黃野百合
玲瓏仔草、砲仔草
黃花豬屎豆
科　名：豆科(Leguminossae)
學　名：*Crotalaria pallida* Ait.
生育特徵：多年生草本，三出葉，小葉橢圓形；黃花；莢果。性喜乾旱陽光足之地。
繁殖方法：實生法繁殖法。
利用部位：根。
主要成分：植物鹼。
功　效：根治手足無力、散腫痛。為清熱祛濕、利尿。
產　地：新竹。

編　號：199

彩色尖葉蘆薈

別　名：蘆薈
科　名：百合科(Liliaceae)
學　名：*Aloe vera* L. var. *chinensis* Haw
生育特徵：多年生草本，葉廣披針形，彩色尖葉。性喜乾濕適中陽光地。
繁殖方法：分枝、扦插繁殖法。
利用部位：葉。
主要成分：蘆薈素。
功　效：鮮葉刮去外皮治肝炎、高血壓。
產　地：新竹。

編　號：200

蚌蘭

別　名：紅三七、水紅竹、紅川七
剝葉三七、日本川七
紅三七草、紫萬年青、蚌花
紫菖、紫蘭、菱角花
科　名：鴨跖草科(Commelinaceae)
學　名：*Rhoeoe discolor* Hance.
生育特徵：多年生草本，葉長橢圓形、葉背紅色；花色紫紅色，且略帶白色。性喜乾濕適中陽光地。
繁殖方法：分枝、扦插繁殖法。
利用部位：全株。
主要成分：植物鹼。
功　效：涼血、潤肺、解鬱、去傷，主治打傷吐血、瘀血、肺炎、咳嗽、敷腫毒、創傷。
產　地：新竹。

編　　號：201

印度羅勒

別　　名：美羅勒、大本九層塔
科　　名：唇形科(Labiatae)
學　　名：*Ocimum gratissimum* Linn.
生育特徵：多年生灌木草本，葉狹葉披針形；唇形花，穗狀花序，種子小。性喜乾濕適中陽光足之地。
繁殖方法：實生繁殖法。
利用部位：全株。
主要成分：含揮發油。
功　　效：有涼血、利水、解毒、殺蟲之效。全草治肝炎、咳血、吐血、尿血、崩漏、腹水、白濁、咽喉腫痛、痔瘡、癰腫。
產　　地：新竹。

編　　號：202

南薑

別　　名：山薑
科　　名：薑科(Zingiberaceae)
學　　名：*Alpinia japonica* Mig.
生育特徵：多年生草本，塊莖肥大，葉廣披針形；開白花，種子紅色。性喜潮濕陽光地。
繁殖方法：塊莖繁殖法。
利用部位：花、子、根。
主要成分：薑黃素。
功　　效：4-5 月採根莖或全草稱山薑，秋季採果實，陰乾稱土砂仁。花稱山薑花。根莖及全草有溫中，祛風散寒、理氣、止痛、止咳之效。治脘腹冷痛、牙痛、風濕疼痛、風濕關節炎、久咳、消化不良、勞傷吐血、跌打損傷、月經不調。花有調中下氣、消酒食毒、消食、止霍亂之效。種仁有芳香健胃、行氣調中之效。治痞脹腹痛、嘔吐腹瀉。
產　　地：新竹。

金剛纂

編　號：203

別　名：霸王鞭、火巷、金剛樹
龍骨刺、羊不楷、火殃簕

科　名：大戟科(Euphorbiaceae)

學　名：*Euphorbia neriifolia* L.

生育特徵：多年生灌木，莖直立，肉質，含白汁，單葉互生，倒卵形。聚繖花序，開黃色花，蒴果。

繁殖方法：扦插繁殖。

利用部位：莖、葉、花蕊。

主要成分：生物鹼。

功　效：莖有消腫、通便、殺蟲之效。治臌脹、急性胃腸炎、腫毒、疥癩、大瘡、皮膚病。葉有消熱化滯、解毒行瘀之效。治熱滯泄瀉、痧穢吐瀉轉筋、疔瘡、跌打積瘀、無名腫毒、霍亂。花蕊解毒消腫。治臌脹。

產　地：台灣、新竹。

台灣堇菜

編　號：204

別　名：紅蚶殼仔草

科　名：堇菜科(Violaceae)

學　名：*Viola formosana* Hay.

生育特徵：多年生草本，葉似犁壁，葉腋抽出花，紫色。性喜乾濕適中陽光地。

繁殖方法：分株繁殖法。

利用部位：全株。

主要成分：堇菜素。

功　效：為治小兒發育不良、小兒食慾不振、胎毒、感冒、白帶、咳嗽、風濕病。

產　地：新竹。

台灣佛甲草

編　　號：205
別　　名：佛甲草、黃花萬年草深山佛甲草
科　　名：景天科(Crassulaceae)
學　　名：*Sedum japonicum* Sieb.
生育特徵：多年生草本，葉披針形、肉質。性喜乾潮濕陰涼地。
繁殖方法：扦插繁殖法。
利用部位：全草。
主要成分：佛甲素。
功　　效：全草治燙火、灼傷。
產　　地：新竹。

西蒙 1 號白甘薯

編　　號：206
科　　名：旋花科(Convolvulaceae)
學　　名：*Ipomoea batatas* Lam.
生育特徵：多年生草本，葉心形塊莖肥大；管狀花。性喜乾旱陽光足之地。
繁殖方法：塊莖及蔓繁殖即營養體繁殖法。
利用部位：塊根、葉。
主要成分：葡萄糖。
功　　效：塊根對葉和胃有滋補作用，可提取葡萄糖及酒精，並可治脊神經麻痺、風濕病、肝及泌尿疾病、調節血液循環及白血病。
產　　地：新竹。

黃花馬齒莧

編　號：207
別　名：馬齒莧、豬母乳、瓜子菜
醬瓣頭草、地馬菜、馬子菜
馬蛇子菜、螞蟻菜、豬母草
豬母菜、長命草、五行草
科　名：馬齒莧科(Portulacaceae)
學　名：*Portulaca oleracea* L.
生育特徵：多年生草本，葉披針形，開黃花，種子細小。耐乾旱陽光足且貧瘠之地區。
繁殖方法：實生法、扦插繁殖。
利用部位：莖葉。
主要成分：生物鹼。
功　效：莖葉治毒蛇傷、急性關節、便秘、結核、小便熱淋澀痛、糖尿病、痢疾、腳氣、水腫、清熱解毒、散血殺蟲、消腫利尿。
產　地：台灣、新竹。

倒弔蓮

編　號：208
別　名：落地生根、腳目草
生刀草
科　名：景天科(Crassulaceae)
學　名：*Bryophyllum pinnatum* (Lam) Kurz.
生育特徵：多年生草本，葉披針形，開桔黃色花，耐乾旱但喜多水潮濕之陽光充足地區。
繁殖方法：葉扦插繁殖。
利用部位：全草。
主要成分：生物鹼。
功　效：散風清血、消腫毒、退黃熱、治癰疽熱毒、蜂巢癰疼痛跌打、蛇傷、風熱、刀傷、水腫、肺炎。
產　地：台灣、新竹。

編　號：209

曇花

別　名：月下美人、瓊花
科　名：仙人掌科(Cactaceae)
學　名：*Epiphyllum oxypetalum* (Dc) Haw.
生育特徵：多年生灌木，嫩莖綠色，葉狀，邊緣成波浪形，中肋堅厚。無葉片，花大形，夜開，短暫。白花，果長圓形紅色。
繁殖方法：扦插繁殖。
利用部位：花、嫩莖。
主要成分：生物鹼。
功　效：清肺熱、治氣喘。
產　地：中國、台灣、新竹。

編　號：210

紅苞鴨跖草

別　名：假金線蓮、紅竹仔菜 中金線蓮、時線蓮
科　名：鴨跖草科 (Commelinaceae)
學　名：*Zebrina pendula* Schnizl.
生育特徵：多年生草本植物，葉廣披針形；莖呈紅色。開紅色花，蒴果。性喜多水潮濕且有遮蔭處為宜。
繁殖方法：扦插繁殖法。
利用部位：全株。
主要成分：含生物鹼。
功　效：涼血、解熱、吐血、腫毒打傷。
產　地：新竹。

編　號：211

黃花曇華

別　名：曇華、蘭蕉

科　名：曇華科、(美人花科)(Cannaceae)

學　名：*Canna flaccida* Salib.

生育特徵：多年生草本植物，葉披針形花黃色；果實成熟後種子呈黑色。耐乾旱但性喜多水濕潤之陽光充足之地。

繁殖方法：塊莖繁殖法。

利用部位：根、莖。

主要成分：含生物鹼。

功　效：滋腎、解毒、破氣、通血、清熱、治肝病、瘰瀝、高血壓。

產　地：新竹。

編　號：212

山藥

別　名：中國長

科　名：薯蕷科(Dioscoreaceae)

學　名：*Dioscorea alata* L.

生育特徵：多年生宿根藤蔓草本植物，葉披針形。耐乾旱但性喜陽光充足地區。

繁殖方法：塊莖繁殖法。

利用部位：塊莖。

主要成分：澱粉蛋白質、薯蕷皂苷等。

功　效：滋養強壯、補脾胃、強肝腎、遺精、夜尿、糖尿病。

產　地：新竹。

編　　號：213

蘄艾

別　　名：芙蓉頭、淡芙蓉、海芙蓉

科　　名：菊科(Compositae)

學　　名：*Crossostephium chinense* Mak.

生育特徵：多年生草本植物，葉線形或狹披針形；頭狀花；黃色，種子細小。耐乾旱但有充足水分且略有陽光之地為宜。

繁殖方法：實生法、扦插繁殖法。

利用部位：全草。

主要成分：含生物鹼。

功　　效：祛風、除濕、固肺、轉骨、解毒、風濕、跌打、肺病、下消、小兒發育不良。

產　　地：新竹。

編　　號：214

薄葉碎米蕨

別　　名：石壁癀、薄葉粉背蕨

科　　名：鳳尾蕨科(Pteridaceae)

學　　名：*Cheilanthes tenuifolia* (Burm)Sw

生育特徵：多年生草本蕨 ，根莖短，葉簇生，五角狀卵形，三至四圓羽狀深裂，裂片卵狀披針形，孢子囊群生頂端。

繁殖方法：孢子、分株繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：生物鹼。

功　　效：肝病、發熱、痢疾，根莖治眼疾、可做百草藥。

產　　地：新竹。

編　　號：215

番石榴

別　　名： 拔仔、那拔、那拔仔
科　　名：桃金孃科(Myrtaceae)
學　　名：*Psidium guajava* Linn
生育特徵：多年生喬木植物，葉細小長橢圓形，果實小，橢圓形。耐乾旱但適宜水分更佳。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：果、根、新葉。
主要成分：根含氨基酸、葉含丁香酚。
功　　效：果治糖尿病、樹皮為收斂劑、根為制慾劑、莖葉搗汁治腹瀉。
產　　地：新竹。

編　　號：216

山茂草

別　　名：山茉草、銳葉小槐花拿身草、磨仔草、抹草茶草、鏈魚麟、大魚麟
科　　名：豆科(Leguminosae)
學　　名：*Desmodium coudatum* (Thbg) DC.
生育特徵：多年生草本植物，葉長橢圓形，開白花，夾果拈衣。耐乾旱但適宜水分較佳。
繁殖方法：實生法、扦插繁殖法。
利用部位：根、莖、葉。
主要成分：含生物鹼。
功　　效：根為眼藥、莖、葉治吐血、衄血、帶　下、癰　腫、腹痛。
產　　地：新竹。

編　號：217

白花虱母草

別　名：白虱母子草、白虱母草
白花虱母子

科　名：錦葵科(Malvaceae)

學　名：*Urena lobata* L.

生育特徵：多年生草本植物，葉近似圓形；花白色，蒴果。性喜乾旱陽光充足之地。

繁殖方法：實生法、扦插繁殖法。

利用部位：根。

主要成分：含生物鹼。

功　效：消炎、解毒良藥、散血凝、風毒、治慢性盲腸炎、梅毒性疥瘡、牙痛、痢疾、酒感、經風、高血壓、慢性胃病。

產　地：新竹。

編　號：218

竹節蓼

別　名：蜈蚣草、鵝江草
寒忘竹、扁竹

科　名：蓼科(Ploygonaceae)

學　名：*Muehlenbeckia platyclada* Meisn.

生育特徵：多年生草本或灌木植物，葉互生披針形。耐乾旱但性喜陽光充足之地。

繁殖方法：扦插繁殖法。

利用部位：莖、葉。

主要成分：含生物鹼。

功　效：治腫毒、蛇傷。

產　地：新竹。

編　　號：219

台灣黃精

別　　名：黃精、野仙薑
科　　名：百合科(Liliaceae)
學　　名：*Polygonatum formosanum* Masamune et Simada.
生育特徵：多年生宿根草本，葉披針形，輪生。穗狀花序，開黃色花。
繁殖方法：塊莖繁殖。
利用部位：根、莖。
主要成分：生物鹼。
功　　效：滋潤心肺、生津養胃、補精隨。※品質優於大陸黃精。
產　　地：台灣、新竹。

編　　號：220

紫花曼陀羅

別　　名：佛茄兒、洋金花曼陀羅華
科　　名：茄科(Solanaceae)
學　　名：*Datura stramonium* L. var. *chalybea* Koch.
生育特徵：一年生或二年生草本植物，葉長橢圓形；花紫白色；果有刺，圓形。性喜乾旱陽光充足之地。
繁殖方法：實生繁殖法。
利用部位：花、種子、葉。
主要成分：含曼陀羅素，生物鹼，莨菪鹼。
功　　效：麻醉、鎮痛、瞳孔擴大、哮喘。
產　　地：新竹。

編　號：221

大本鼠尾癀

別　名：鼠尾黃、白花草
虎咬癀、白花仔草

科　名：唇形科(Labiatae)

學　名：*Leucas mollissima* Wall var *chinensis* Benth.

生育特徵：多年生草本，莖基部伏地而生莖有短硬毛葉對生橢圓形，常生短梗毛；花輪繖形花序，腋生；白色瘦果細小。多生水溝邊草地陰濕處。

繁殖方法：實生法、扦插繁殖法。

利用部位：全株。

主要成分：含生物鹼及樹脂。

功　效：消炎退癀藥、葉敷腫毒、疔瘡、毒蛇傷。

產　地：新竹。

編　號：222

絡石

別　名：絡石藤、椿根藤
爬牆虎、鹿角草、爬山虎

科　名：夾竹桃科(Apocynaceae)

學　名：*Trachelospermum jasminoides* (Lindl.) Lemaire

生育特徵：多年生常綠木質藤本植物，葉對生橢圓形或卵狀披針形；花白色，腋生或頂生，聚繖花序；蓇葖果。生山野荒地耐旱常攀援石上或植物上。

繁殖方法：扦插繁殖法。

利用部位：全株。

主要成分：莖含牛蒡苷，絡石糖苷等。

功　效：宣風濕、涼血、通筋絡、消腫解毒、強壯、通經、鎮咳、喉痛、癰腫、腰臂部骨節痛疾關節疼痛、腫毒。

產　地：新竹。

編　號：223

雙花龍葵

別　名：烏子菜、烏子菜頭
科　名：茄科(Solanaceae)
學　名：*Solanum nigrum* L.
生育特徵：多年生草本植物，葉互生，卵形，圓形至橢圓形；花單性；果紅色。耐乾旱喜陽光充足地區。
繁殖方法：實生繁殖法。
利用部位：全株。
主要成分：含生物鹼。
功　效：抗癌、心葉當野菜。
產　地：新竹。

編　號：224

伏牛

別　名：虎刺、伏牛花
科　名：茜草科(Rubiaceae)
學　名：*Damnacanthus indicus* Garetn. fil.
生育特徵：多年生常綠小灌木，葉對生，分枝多有刺。葉卵形或闊橢圓形。花白色，核果。
繁殖方法：扦插繁殖。
利用部位：根、莖、葉。
主要成分：生物鹼。
功　效：根驅風、治風濕、疲勞過度、根莖葉為消腫藥。
產　地：中國、台灣、新竹。



茜草

編　　號：225

別　　名：紅藤仔草、過山龍
紅根仔草

科　　名：茜草科(Rubiaceae)

學　　名：*Rubia cordifolia* L.

生育特徵：多年生攀援生草本，莖方形。上有倒生刺，葉四片輪生，葉卵狀心形或狹卵形，聚繖花序。白花。漿果。

繁殖方法：扦插繁殖法。

利用部位：根、根莖

主要成分：茜草素。

功　　效：為通經及行血藥，利尿、咯血、吐血、婦女病、消瘀、鎮痛、治黃疸、水腫及強壯。

產　　地：台灣、新竹。

山香

編　　號：226

別　　名：假走馬風、臭狗蘇
白紫蘇、白狗蘇、冇骨消

科　　名：唇形科(Labiatae)

學　　名：*Hyptis suaveolens* Poir.

生育特徵：一年生草本植物，莖四方形多分枝，葉對生，卵形至長橢圓形；聚繖花序生腋內，花藍色，唇形；小堅果，扁平。生於林邊、荒野草地上耐乾旱喜陽光充足地區。

繁殖方法：實生法繁殖法。

利用部位：全株。

主要成分：含揮發油香氣及生物鹼。

功　　效：感冒祛風、瘧疾、創傷、頭痛。

產　　地：新竹。



編　號：227

霍香

別　名：排香草、大葉薄荷
野霍香
科　名：唇形科(Labiatae)
學　名：*Agastache rugosa* (Fisch. & May.) Ktze.
生育特徵：多年生草本植物，葉對生橢圓形；花唇形花，頂生。喜生水分適宜及陽光充足地區。
繁殖方法：扦插繁殖法。
利用部位：全株。
主要成分：含精油，鞣質及苦味質等。
功　效：健胃、清涼解熱藥、止嘔、鎮嘔、吐瀉、腹痛、胸悶。
產　地：新竹。

編　號：228

何首烏

別　名：生首烏、首烏、夜交藤根
地精、夜會、陳知白
馬肝石、桃柳藤、九真藤
赤葛、瘡帚、紅内消
科　名：蓼科(Polygonaceae)
學　名：*Polygonum multiflorum* Thunb.
生育特徵：多年生落葉藤本植物，莖中空多分枝葉卵狀心形，無毛，花小。白色。圓錐狀花序，頂生或腋生，瘦果，黑色，塊根圓錐形紡錘形棕色至暗紅色。
繁殖方法：扦插繁殖法。
利用部位：塊根、藤(夜交藤)。
主要成分：含大黃酚、大黃素及卵磷脂。
功　效：補肝腎、益精血、烏鬚髮之功。
產　地：新竹。

毬蘭

編　號：229

別　名：櫻蘭、玉蝶梅

科　名：蘿藦科(Asclepiadaceae)

學　名：*Hoya carnosa* R. Br.

生育特徵：多年生蔓性藤本植物，葉對生呈卵狀長橢圓形。喜生於植物上。

繁殖方法：實生法、扦插繁殖法。

利用部位：藤。

主要成分：含生物鹼。

功　效：補氣血、益乳汁、清熱解毒、尿道炎。

產　地：新竹。

咬人狗

編　號：230

別　名：咬人貓

科　名：蕁麻科(Urticaceae)

學　名：*Laportea pterostigma* Wedd.

生育特徵：多年生常綠灌木，葉卵形或橢圓形；花為聚繖狀圓錐花序，腋生，花梗紫色；瘦果；種子細小扁卵形。在山野自生，耐旱。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：葉、花。

主要成分：含生物鹼。

功　效：敷癰腫、瘰瀝、癰疽、腫毒、發背。

產　地：新竹。

編　　號：231

薏苡

別　　名：薏苡仁、苡仁、薏苡米、解蠡、苡米、苡仁米、土薏米

科　　名：禾本科(Gramineae)

學　　名：*Coix lacryma jabi* L.

生育特徵：一年生或多年生草本植物，葉互生，條狀披針形；總狀花序，成束生於葉腋間小穗；單性果，卵球形。生荒野路邊、水溝邊，性喜適宜水分陽光足之地。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：果實、根。

主要成分：種子含薏苡酯(coixenolide)，根含 coixol。

功　　效：鎮咳、抗癌、主治肺結核、胃癌、鎮痛、解熱。

產　　地：新竹。

編　　號：232

蕎麥

別　　名：甜麥、荍麥、烏麥、花蕎

科　　名：蓼科(Polygonaceae)

學　　名：*Fagopyrum vulgare* Hill.

生育特徵：一年生草本植物，葉互生，廣三角形；花總狀花序，白色或淡紅色，瘦果。卵形。性喜適宜水分陽光充足之地。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：種子、花、葉

主要成分：含維生素、蛋白質及芸香苷（rutin）等。

功　　效：種子炒焦熱水沖服治絞腸沙痛、開花時之花及葉含芸香苷(rutin)3-5% 可防止中風。

產　　地：中國、台灣、新竹。

編　　號：233

金門一條根

別　　名：闊葉大豆
科　　名：豆科(Leguminosae)
學　　名：*Gclycine fomentella* Hay.
生育特徵：多年生草本植物，全株被毛葉互生三出掌狀複葉，葉片長卵形橢圓狀；花短，總狀花序，腋生；種子球形黑色。多生於平野及矮丘之草地中，喜陽光之地。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：根。
主要成分：含酚類及氨基酸等。
功　　效：治風濕關節痛、跌打損傷、亦可製藥酒。
產　　地：新竹、金門。

編　　號：234

玉竹

別　　名：明玉竹、萎蕤、尾參山尾參、關玉竹
科　　名：百合科(Liliaceae)
學　　名：*Polygonatum officinale* All.
生育特徵：多年生草本植物，葉互生長橢圓形；花腋生；漿果，球形；根莖橫生。喜生山區林下或山坡較陰濕的地區。
繁殖方法：塊莖繁殖法。
利用部位：根、莖。
主要成分：含生物鹼。
功　　效：強壯、體弱多尿、多汗、遺精、腰痠。
產　　地：新竹。

編　號：235

六神草

別　名：金鈕扣、鐵拳頭
科　名：菊科(Compositae)
學　名：*Spilanthes acmella* (Linn.) Murr.
生育特徵：多年生草本植物，葉呈橢圓形；花呈黃褐色，果實呈金鈕扣型。生長適應力強，但較喜歡潮濕之地。
繁殖方法：實生法、扦插繁殖。
利用部位：全草
主要成分：含生物鹼。
功　效：治齒痛、腹痛止咳平喘、解毒利溼、消腫止痛之效、治感冒、咳嗽、哮喘、百日咳、肺結核、痢疾、腸炎、瘧疾、瘡癧腫毒、風濕性關節炎、牙痛、跌打損傷、毒蛇咬傷。
產　地：中國、台灣、新竹。

編　號：236

石盤草

別　名：帽仔盾、帽仔頓草
磨仔盾草
科　名：錦葵科(Malvaceae)
學　名：*Abutilon indicum* (L.) Sweet.
生育特徵：多年生草本植物，葉呈橢圓形，果如石盤狀。生長較耐旱，貧瘠之地均適應，但有適度之潮濕地為宜。
繁殖方法：實生法、扦插繁殖法。
利用部位：全株。
主要成分：含生物鹼、礦物質等。
功　效：散風、清血熱、升清降濁、開竅活血、為耳聾之良藥、主治耳聾、耳鳴、重咡、小兒慢脾、利尿劑、白帶多、頭痛。
產　地：台灣。

編　號：237

甜珠草

別　名：甜珠仔草、珠仔草
雞骨癀、甘草、甜草
滿天星、滿天青硬骨草

科　名：玄參科(Scrophilariaceae)

學　名：*Scoparia dulcis* L.

生育特徵：多年生草本植物葉呈三輪葉，長橢圓形，葉緣有鋸齒；花淺紫色；種子小。耐旱適應力強，但以潮濕地為主。

繁殖方法：實生法、扦插繁殖法。

利用部位：全株。

主要成分：含糖、礦物質等。

功　效：涼血、退熱、肺部疾患、肺炎、吐血、血熱、高血壓、眼疾。

產　地：台灣。



編　號：238

益母草

別　名：紫花益母草

科　名：唇形科(Labiatae)

學　名：*Leonurus sibiricus* L. var. *albiflora* Miguel.

生育特徵：一年生或越年生草本植物，根出葉，橢圓形，葉緣 5-9 淺裂，長柄中部葉掌狀 3 深裂；花腋生；穗狀花序，淡紅色或紫紅色；小堅果。習生於路旁，山坡地等地。

繁殖方法：實生繁殖法。

利用部位：全草。

主要成分：含益母草鹼、芸香等。

功　效：去瘀生新、活血調經、利尿、月經不調。

產　地：中國、台灣、日、韓。

編　號：239

艾草

別　　名：艾
科　　名：菊科(Compositae)
學　　名：*Artemisia princeps* Pamp. var. *orientalis*(Pamp.) Hara.
生育特徵：多年生直立草本植物，葉互生，羽狀分裂；花小，頭狀花序，內管狀花；瘦果小。生於路旁荒野草地。
繁殖方法：分枝、扦插繁殖法。
利用部位：枝、葉、根幹。
主要成分：桉油酚、維他命、礦物質、纖維。
功　　效：治腹痛、吐瀉、止血、頭痛。
產　　地：中國、台灣。

編　號：240

土牛膝

別　　名：土牛七、擦鼻草、掇鼻草毛蟹目、印度牛膝倒鉤草、倒刺草、白牛膝
科　　名：莧科(Amaranthaceae)
學　　名：*Achyranthes aspera* L. var. *indica* L.
生育特徵：一年生或二年生草本植物，葉對生，葉片近圓形，倒卵形或長橢圓形。穗狀花序，花淡綠色，蒴果細小。
繁殖方法：實生法繁殖法。
利用部位：根、莖、葉。
主要成分：生物鹼。
功　　效：根治頭風、腰膝痛、莖及葉治肝、腎疾患、蛇傷。
產　　地：中國、台灣、新竹。

白花馬齒莧

編　　號：241

別　　名：白豬母乳

科　　名：馬齒莧科(Portulaceae)

學　　名：*Portulaca oleracea* L. var. *allbifloria*

生育特徵：一年生草本植物，葉對生或互生，葉片肥厚肉質，三角狀扇形，倒卵形，匙形，花兩性，開白花，蒴果。

繁殖方法：實生法繁殖法。

利用部位：全草

主要成分：生物鹼。

功　　效：糖尿病、痢疾、腳氣、水腫。

產　　地：中國、台灣。

粉藤

編　　號：242

別　　名：粉葛藤

科　　名：豆科(Leguminosae)

學　　名：*Pueraria pseudohirsuta* Tang.et. Wang.

生育特徵：多年生藤本植物，莖上有白粉 ，葉互生，心形或近似卵狀心形，小穗花，白色。

繁殖方法：扦插繁殖。

利用部位：塊根。

主要成分：生物鹼。

功　　效：性平、味甘辣解表退熱、生津止渴、止瀉痢、解酒毒、為發汗解熱要藥、主治熱病初期、邪在肌裡、發熱口渴、頭痛、頸背強痙病、泄瀉、血痢、溫瘧、痘疹初期不易透者及中酒毒等。

產　　地：中國、台灣。



編　　號：243

華澤蘭

別　　名：澤蘭
科　　名：菊科(Compositae)
學　　名：*Eupatorium lindleyanum* DC.
生育特徵：多年生草本植物，莖直立，呈紫紅色。葉對生，葉片狹披針形或線狀披針形。頭狀花序，頂生，開白花，瘦果。
繁殖方法：實生法、扦插繁殖。
利用部位：莖、葉。
主要成分：生物鹼。
功　　效：解熱抗癌、治血癌。
產　　地：中國、台灣。

編　　號：244

扁蓄

別　　名：萹蓄、妹子草、扁竹大鐵馬鞭、牛鞭草、地蓼萹蓄頭、豬牙草、扁芽草柊莭草、道生草、扁辨、扁蔓
科　　名：蓼科(Polygonaceae)
學　　名：*Polygonum aviculare* L.
生育特徵：多年生草本植物，莖互生，橢圓形，開小花，白色，結蒴果。
繁殖方法：實生法、扦插繁殖。
利用部位：全草。
主要成分：生物鹼。
功　　效：黃疸熱淋病、殺草、腹痛、敷惡瘡、治便毒、利尿、燥溼、消炎、止瀉、祛蟲
產　　地：中國、台灣。

編　號：245

臭茉莉

別　名：洋嗅茉莉、臭苜莉
白茉莉、臭屎茉莉
科　名：馬鞭草科(Verbenaceae)
學　名：*Clerodendrum fragrans* Vent.
生育特徵：多年生灌木植物，葉呈卵形、闊卵形至近似心形，花頂生，白花，漿果。有臭屎味。
繁殖方法：扦插繁殖。
利用部位：根、莖(全年採收)
主要成分：生物鹼。
功　效：五毒症、傷風、疥癩、風濕、腳痛。
產　地：中國、台灣。

編　號：246

狹葉車錢草

別　名：錢貫草、五筋草、五斤草、五根草、車前、車前草
科　名：車前科(Plantaginaceae)
學　名：*Plantago formosana* Tateishi et Masam
生育特徵：台灣山野到處可見，喜生於乾濕有陽光之地。葉呈狹披針形，自基部生出葉，花穗抽出，穗狀花序，白花，蒴果。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：全草。
主要成分：生物鹼。
功　效：解熱、利尿、鎮咳、祛痰、止瀉、明目。
產　地：中國、台灣。

編　號：247

堇菜

別　名：小堇菜
科　名：堇菜科(Violaceae)
學　名：*Vioia minor* Mak
生育特徵：台灣山野多年生草本植物，根莖短，葉三角狀廣披針形，花深紫色，小，蒴果。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：葉。
主要成分：生物鹼。
功　效：敷腫毒。
產　地：中國、台灣。

編　號：248

水薄荷

別　名：紫蘇草、水芙蓉、香石龍尾、水管筒、止咳草、麻雀草
科　名：唇 形科(Labiatae)
學　名：*Limnophila aromatica* (Lam) Merr.
生育特徵：多年生草本植物，葉呈橢圓形、廣卵形，花腋生，紫白色。
繁殖方法：扦插繁殖。
利用部位：全草。
主要成分：生物鹼。
功　效：治感冒、咳嗽、百日咳、毒蛇咬傷、癰瘡腫毒、癬、皮膚搔癢。
產　地：中國、台灣、新竹。

編　號：249

夏枯草

別　名：夏枯球、夏枯花、夏枯草花、鐵色草、大頭花

科　名：唇形科(Labiatae)

學　名：*Prunella vulgeris* L. var. *linacina*. Nakai

生育特徵：多年生草本植物，葉呈橢圓形，互生，花頂生，大頭花，開紫色花，蒴果。

繁殖方法：實生法、扦插繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：生物鹼。

功　效：花清肝火、散鬱結。主治癭瘤瘰癧、目赤腫痛、癰腫瘡毒、全草為利尿、淋病、子宮病、瘰癧、頸淋巴腺結核、高血壓。

產　地：中國、台灣。

編　號：250

番杏

別　名：蕃杏

科　名：番杏科 Aizoaceae

學　名：*Tetragonia tetragonoides* O.Kuntze

生育特徵：台灣自生各地之一年生匍匐草本，葉互生，卵狀菱形。花腋生，黃白色，核果。

繁殖方法：扦插繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：含鈣、磷、鐵、蛋白質、脂肪等成分。

功　效：胃癌、食道癌。

產　地：中國、台灣。

編　　號：251

小酸模

科　　名：蓼科 Gonaceae poly

學　　名：*Rumex acetosella* L.

生育特徵：台灣原野，多年生草本植物，根際葉叢生，葉互生，披針形或長橢圓形。總狀花序，開紅綠色花，輪生，瘦果。

繁殖方法：實生法、分枝繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：生物鹼。

功　　效：根及葉行血、全草為利尿、發汗。

產　　地：台灣、新竹。

編　　號：252

鴨兒芹

科　　名：繖形科 Umbelliferae

學　　名：*Cryptotaenia japonica* Hassk

生育特徵：多年生草本植物，莖直立，綠色，葉互生，葉三出，小葉長橢圓狀披針形，繖形花序，開白花，瘦果。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：葉、枝。

主要成分：生物鹼。

功　　效：葉治蛇蜂傷、枝葉當野菜用。

產　　地：台灣、新竹。

編　號：253

白埔姜

別　名：白蒲姜、駁骨丹
水楊柳、洋波頭
科　名：馬錢科 Loganiaceae
學　名：*Buddleia asiatica* Lour
生育特徵：多年生灌木，葉為長披針形，互生。為穗花序，開白花，蒴果。
繁殖方法：實生法、分枝繁殖法。
利用部位：全株。
主要成分：生物鹼。
功　效：全年採枝葉 治膚癢 風疹濕疹 蕁麻疹 根幹為祛風清血滋腎，主治風濕病、小兒麻痺、腫毒、下消。
產　地：台灣原野地區、新竹

編　號：254

生毛將軍

別　名：毛將軍
科　名：菊科 Composiitae
學　名：*Blumea sericans Hook* F.
生育特徵：一年生草本植物，葉互生，葉呈長橢圓形，深鋸齒，裂片深，頂生，聚合花序，白帶紫色，蒴果。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：全草。
主要成分：生物鹼。
功　效：全草治肺癰、肺病、肋膜積水。
產　地：台灣原野自生、新竹。

編　　號：255

苦許氏草（長冠草）

別　　名：麻辣草、同瓣草
科　　名：桔梗科(Campanulaceae)
學　　名：*Laurentia longiflora* (Linn) Presl
生育特徵：台灣原野多年生草本，莖直立，葉互生，葉片長披針形或長橢圓形，缺刻狀緣。花單生腋出，花冠長，白色，蒴果。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：全草。
主要成分：生物鹼。
功　　效：採全草有麻痺、止痛、解毒、消腫、外用風濕性關節炎、癰瘡腫毒。
產　　地：美洲、大洋洲、非洲及中國、台灣。



編　　號：256

羊蹄

別　　名：禿頭草、大頭草
土大蔥根、山殼草
殼草頭。
科　　名：蓼科（Polyganaceae）
學　　名：*Polygonum japonicus* Houtt
生育特徵：台灣原野多年生草本，莖帶紫色，葉互生，呈長橢圓狀披針形。圓錐花序，花綠色，果卵圓形。
繁殖方法：實生法、分枝繁殖法。
利用部位：採全草。
主要成分：生物鹼。
功　　效：治濕疹、消腫、為瀉火、通便、殺蟲消腫退癀。外搽疥癬、濕疹、根汁塗禿頭、疥癬、為緩下劑。可代大黃。
產　　地：非洲、非洲及中國、台灣、新竹。

編　　號：257

頭花蓼

別　　名：石辣蓼、小紅草、石莽草
科　　名：蓼科（Polyganaceae）
學　　名：*Polygonum capitatum* Ham exD Don
生育特徵：多年生草本，葉橢圓形、卵形，互生。花為總狀花序，頭狀花，淡紅色，瘦果。
繁殖方法：實生法、扦插繁殖法。
利用部位：全草。
主要成分：生物鹼。
功　　效：解毒、散瘀、利尿通淋。
產　　地：台灣、新竹。

編　　號：258

老鼠芳

別　　名：老鼠怕、薊罌粟
科　　名：罌粟科 Papaveraceae
學　　名：*Argemone mexicana* L.
生育特徵：台灣原野自生之一年生草本，全株被粉白色，莖葉生有多刺，葉身為深波狀羽狀中裂，裂片缺刻或銳鋸齒，似薊，有白色汁，開黃花，蒴果。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：全草或其乳汁。
主要成分：含小蘗鹼等成分。
功　　效：葉發汗、祛疾、消腫、利膽、祛痰、止瀉、消炎止痛。
產　　地：台灣、新竹。

編　號：259

蒺藜

別　名：蒺骨子、白蒺藜、白吉利
野菱角、地菱兒、地菱
草黃子、郎虎子、蒺藜狗子
刺蒺藜、蒺藜子、白蒺莉、吉莉子
科　名：蒺藜科 Zygophyllaceae
學　名：*Tribulus terrestris* L.
生育特徵：台灣海岸原野自生之一年生匍匐草本，莖由基部分枝，全草密生柔毛，葉對生，偶數羽狀複葉，小葉對生，長橢圓形，夏開花，黃色，自葉腋生，蒴果。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：全草及果。
主要成分：含礦物質、脂肪、油酸等成分。
功　效：採果療瘡除翳主治眼疾；鎮痛、強緩和藥、肋痛、療諸瘍、去風活血。
產　地：台灣、新竹。

編　號：260

假千日紅

別　名：伏生千日紅、野生千日紅
雞冠千日紅、野生圓仔花
銀花莧、地錦莧、地錦草
科　名：莧科 Amaranthacea
學　名：*Gomphrena celosioides* Martius
生育特徵：兩年生草本，長 20—40cm，葉對生，長橢圓形或廣卵形，長 2—4cm、寬 0.8—1.2cm。穗狀花序、頂生、花灰白色，種子球形或卵形，花果夏秋間收。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：全草。
主要成分：生物鹼。
功　效：全年採全草，清熱利濕、涼血、止血、治痢疾、白帶、糖尿病。
產　地：巴西及台灣、新竹。

馬鞍籐

編　　號：261

別　　名：厚籐、紅馬鞍籐

科　　名：旋花科 Convolvulaceae

學　　名：*Ipomoea pescaprae* Roth

生育特徵：多年生藤蔓植物，葉互生，呈馬鞍型之葉片，自葉腋抽出長管花，紅色，蒴果。

繁殖方法：扦插繁殖法。

利用部位：根、全草。

主要成分：生物鹼。

功　　效：採根為驅風、利尿、主治風濕、神經痛、關節炎、淋病。

產　　地：台灣海岸原野自生、新竹。

倒地鈴

編　　號：262

別　　名：假苦瓜、風船葛

科　　名：無患子科 Sapindaceae

學　　名：*Cardiospermum halicacabum* Linn

生育特徵：一年生藤蔓草本，葉互生，圓卵形、長橢圓形，花單生，自腋出，淺黃色，漿果。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：生物鹼。

功　　效：採全草涼血、消瘡毒、蛇傷、煎水洗疥癩、葉敷腫毒。

產　　地：台灣、新竹。



編　　號：263

黃心細

別　　名：野甕菜
科　　名：紫茉莉科 Nyctaginaceae
學　　名：*Boerhaavia diffusa* Linn
生育特徵：台灣原野自生，多年生匍匐性草本，全草有毛，卵狀長橢圓形，圓錐花序，開黃花，瘦果。
繁殖方法：實生法、扦插繁殖。
利用部位：根部。
主要成分：生物鹼。
功　　效：採根有活血散瘀、強筋骨、調經、消腫、治跌打損傷、筋骨疼痛、月經不調、小兒疳積。
產　　地：蘭嶼海岸地區、高雄、屏東及澎湖、新竹。

編　　號：264

腎葉山螞蝗

科　　名：豆科 Leguminosae
學　　名：*Desmodium renifolium* (L.) Schindler
生育特徵：多年生草本，匍匐性，葉互生，單葉，腎形或闊心形。總狀花序，頂生，腋生，粉紅色，莢果。
繁殖方法：實生法、扦插繁殖。
利用部位：全草。
主要成分：生物鹼。
功　　效：全草利尿、消炎、治尿道炎、胃臟炎。
產　　地：台灣、新竹。



編　號：265

磨盤草

別　名：冬葵子、米藍草、絮薇草
帽子盾、倒吊風、四米草
朴仔草、磨仔盾草

科　名：錦葵科 Malvaceae

學　名：*Abutilon indicum* (L.) Sweet

生育特徵：多年生草本，葉互生，呈心形，邊緣鋸齒。自葉腋出，開黃花，結果，似磨仔盾。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：生物鹼。

功　效：清熱、利濕、開竅、活血。治泄瀉、淋病、耳鳴耳聾、疝氣、癰腫、蕁麻疹。根：清熱、利濕、開竅、活血。治咳嗽、淋濁、泄瀉、中耳炎、喉蛾。子：澀腸利水。內服：煎湯 3—5 錢，外用：搗敷或煎水熏洗。

產　地：台灣、新竹。

編　號：266

尖刀黃（刀傷草）

別　名：雙板刀、太公英
黃花草、三板刀。

科　名：菊科 Compositae

學　名：*Ixeris laevigata* (Blume) Schultz Bip ex Maxim var. *oldhami* (Maxim) Kitamura

生育特徵：多年生草本，葉呈長橢圓形或紡錘狀披針形，葉背灰白色，生多數頭狀花，成圓錐狀，黃色，瘦果。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：全草或地上部。

主要成分：生物鹼。

功　效：全草消炎解熱、健胃。療肝炎、腸炎、肺炎、氣管炎、膽炎、疔癰。治胃弱、血瘀、跌打內傷、感冒、手足麻木、肺積水、刀傷、蛇傷等　。

產　地：台灣、新竹。

編　號：267

六角英

別　　名：鯽魚膽、槍刀藥、紅絲線。
科　　名：爵床科 Acanthaceae
學　　名：*Hypoestes purpurea* R. Br.
生育特徵：多年生灌木，莖節膨大，葉對生，葉片長闊卵形至卵狀披針形，穗狀花序，頂生或葉腋生，紫紅色，蒴果。
繁殖方法：實生法、扦插繁殖。
利用部位：全草。
主要成分：生物鹼。
功　　效：消炎、散瘀、止血、咳嗽。治支氣管炎、肺結核、咳血、糖尿病。
產　　地：台灣、新竹。

編　號：268

地榆

科　　名：薔薇科 Rosaceae
學　　名：*Sanguisorba officinalis* L.
生育特徵：多年生草本，全草無毛，根際葉長橢圓狀卵形，羽狀複葉，穗狀花序，開紫色花，瘦果。
繁殖方法：實生法、分枝繁殖。
利用部位：採根。
主要成分：含地榆苷（Sanguisorbin）。
功　　效：涼血、止血、為收斂止血劑、治下血、吐血、咯血、月經過多、赤痢。
產　　地：中國、台灣、新竹。

編　　號：269

濱豆

別　　名：濱刀豆

科　　名：豆科(Leguminosae)

學　　名：*Canavalia maritima* (Aubl) Piper.

生育特徵：多年生蔓性藤本，葉互生，3出複葉，倒卵形或廣卵形。頂生，總狀花序，紫紅色，種子橢圓形，花果夏秋間收。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：生物鹼。

功　　效：種子為瀉劑、吐劑。全株有清熱、發汗、解毒、消腫。根：利濕、消腫、解毒、止痛、治肝炎。

產　　地：台灣海岸地、新竹。



編　　號：270

白牛膝

別　　名：白啜鼻草、白土牛七
牛膝頭、掇鼻草、牛膝

科　　名：莧科(Amaranthaceae)

學　　名：*Achyranthes obtusifolia* Lam.

生育特徵：多年生草本，高 60-120cm，葉片卵形，對生，長 4.5-12cm，寬 1-5cm，穗狀花序，花綠色，種子長圓形，花果期 6-11 月。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：根、莖、葉。

主要成分：生物鹼。

功　　效：根治頭風、莖、葉治肝、腎病、蛇傷、膝關節病。

產　　地：中國、韓、蘇、日、印及台灣等地。

編　　號：271

草海桐

別　　名：水草
科　　名：草海桐科(Goodeniaceae)
學　　名：*Scaevola hainanensis* Hance.
生育特徵：多年生小喬木，葉互生，倒橢圓形或倒披針形，花腋生，白花，小堅果。
繁殖方法：實生法、扦插繁殖。
利用部位：葉及樹皮。
主要成分：生物鹼。
功　　效：葉治消化、髓治腹瀉。葉及樹皮治肺氣病。
產　　地：台灣、新竹。

編　　號：272

蛇總管

別　　名：細葉金午時花、黃花稔、嗽血仔草
科　　名：錦葵科（Malvaceae）
學　　名：*Sida acuta* Burm.f.
生育特徵：多年生草本，葉互生，披針形或線狀披針形，花黃色，單生或成雙腋生，蒴果。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：根、葉
主要成分：生物鹼。
功　　效：根治蛇傷、膿泡瘡、散毒、葉敷瘡痛。
產　　地：台灣、新竹。

綬草

編　　號：273

別　　名：盤龍參、春虫、青龍盤柱
青龍柱、清明草、青龍天柱

科　　名：蘭科(Orchidaceae)

學　　名：*Spiranthes sinensis* (Pers.) Ames

生育特徵：多年生草本，根莖短，葉成線形至線狀披針形，穗狀花序，粉紅色，蒴果。

繁殖方法：實生法、分枝繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：生物鹼。

功　　效：根當巴戟天用，補骨壯陽，強筋骨，祛風濕，治陰虛之症，本省 1-5 月採全草，滋陰、退火、增加津液有如麥冬、主治吐血、衂血、血熱頭痛、口乾、久年下痢、腦膜炎、小兒發育不良、腎臟炎。

產　　地：台灣、新竹。

蜘蛛抱蛋

編　　號：274

別　　名： 蜈蚣草、飛天蜈蚣

科　　名：百合科(Liliaceae)

學　　名：*Aspidistra elatior* Bl

生育特徵：多年生草本，根莖橫走，葉基生，直立，橢圓披針形、闊披針形。花莖短，頂生花，暗紫色，亦有白色，漿果。

繁殖方法：分枝繁殖。

利用部位：根、莖。

主要成分：生物鹼。

功　　效：根莖強心、利尿、祛痰。

產　　地：台灣、新竹。

毛連菜

編　　號：275

別　　名：白花燈豎杇、毛地膽草登豎杇、丁豎杇、地塹頭。

科　　名：菊科(Compositae)

學　　名：*Elephantopus mollis* H.B.K

生育特徵：一年生草本，直立 ，葉互生，長披針形至卵形，花頂生，腋生，白花，瘦果。

繁殖方法：實生法、分枝繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：生物鹼。

功　　效：全草為利尿劑，主治腎炎、淋病、根治疝氣，榨汁外敷，治蛇傷。

產　　地：台灣、新竹。

半枝蓮

編　　號：276

別　　名：向天盞

科　　名：唇形科(Labiatae)

學　　名：*Scutellaria rivularis* Benth

生育特徵：多年生或越年生草本，莖直立，葉對生，葉片卵形至披針形，總狀花序，頂生，腋生，淺藍紫色，小堅果。

繁殖方法：實生法、分枝繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：生物鹼。

功　　效：全草活血行氣、散風理咳、解熱止痛、治跌打、驚風、肺炎、喉痛、腹痛、胎毒、盲腸炎。

產　　地：台灣、新竹。

白花藤

編　號：277

別　名：黑面馬、烏面馬、白花丹
白雪花、一見消

科　名：藍雪科(plumbaginaceae)

學　名：*Plumbago zeylanica* L.

生育特徵：多年生蔓性木質狀草本，葉互生，卵形，卵狀橢圓形至長橢圓形，穗狀花序，頂生，腋生，花白色或淺藍色，蒴果。

繁殖方法：實生法、扦插繁殖。

利用部位：根或全草。

主要成分：生物鹼。

功　效：祛風、散瘀、解毒、殺蟲。治風濕關節疼痛、血瘀經閉、治跌打損傷、腫毒、惡瘡、疥癬。

產　地：台灣、新竹。

非洲一枝黃花

編　號：278

別　名：黃花一支香、一枝黃花
千根癀、百條根、土澤蘭
黃花仔、柳枝癀。

科　名：菊科(Compositae)

學　名：*Solidago virga* - aurea L.var. *leiocarpa* (Benth.) A.Gray

生育特徵：多年生宿根性草本，莖直立，葉互生，葉較大，漸上葉愈小，為卵形至短圓形，圓錐花序，由腋生的總狀花序聚集而成，花黃色，瘦果近圓柱形。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：生物鹼。

功　效：採全草，有清熱解表、疏風袪痰、解毒消毒。治感冒頭痛、外感身痛、咽喉腫痛、扁桃腺炎、百日咳、肝炎黃膽、小兒驚風、腎、膀胱炎、癰腫發背、鵝掌風、皮膚瘙癢、跌打損傷。

產　地：亞洲、非洲及台灣、新竹。

黃花蜜菜

編　　號：279

別　　名：蟛蜞菊、寒丹草

科　　名：菊科(Compositae)

學　　名：*Wedelia chinensis* (Osbeck) Merr.

生育特徵：多年生草本，匍匐狀，葉對生，短圓狀披針形，頭狀花序，頂生，腋生，黃花，瘦果。

繁殖方法：扦插繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：生物鹼。

功　　效：全草清熱解毒、婦女崩血、漏血、治黃疸、急性肝炎加冰糖。

產　　地：台灣、新竹。

鴨跖草

編　　號：280

別　　名：竹葉菜、三角草、鴨仔草

科　　名：鴨跖草科(Commelinaceae)

學　　名：*Commelina communis* L.

生育特徵：一年生草本，葉披針形或卵狀披針形。

繁殖方法：實生法、扦插繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：全草含飛燕草苷(delphin)，粘液質，花含藍鴨拓草苷(commelinin)，鴨拓黃酮苷(flavocommelin)，鴨拓草花色苷(awobanin)等，種子含脂肪油。

功　　效：清熱解毒、利水消腫、用於風熱感冒、高燒不退、咽喉腫痛、水腫尿少、熱淋澀痛、痛腫疔瘡。

產　　地：台灣、新竹。

雞腳刺

編　　號：281

別　　名：雞觴刺、雞觸刺

科　　名：菊科(Compositae)

學　　名：*Cirsium albescens* Kitam

生育特徵：多年生草本，葉互生，葉片羽狀裂片，葉緣有刺，花頂生或腋生，白花，蒴果。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：根、葉

主要成分：生物鹼。

功　　效：採根治咳血、白帶、葉解熱。

產　　地：台灣、新竹

光風輪

編　　號：282

別　　名：剪刀花、塔花

科　　名：唇形科(Labiatae)

學　　名：*Clinopodium gracile* (Benth) ktze.

生育特徵：多年生草本，葉對生，橢圓形或卵狀披針形，穗狀花序，開白色花，瘦果。

繁殖方法：實生法、扦插繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：生物鹼。

功　　效：全草治乳腺炎、痢疾、蕁麻疹。

產　　地：台灣、新竹。

編　號：283

知母

別　名：蚔母、提母

科　名：百合科(Liliaceae)

學　名：*Anemarrhena asphodeloides* Bge

生育特徵：多年生草本，根橫生，葉莖生，叢生，線形，穗狀花序，綠色至紫綠色，蒴果。

繁殖方法：分株繁殖。

利用部位：根。

主要成分：含皂苷、芒果苷、異芒果苷。

功　效：根經過炮製，過程勿用鐵器，味苦、寒、滋陰降火、潤燥滑腸、忌脾胃虛寒、大便溏泄者忌服。可治消渴、氣虛癆傷、面黃瘦、倦怠、體數熱者、肺癆實熱、面目苦腫、咳嗽喘急、煩熱頰赤。

產　地：中國、台灣、新竹。

編　號：284

牻牛兒苗

別　名：尼泊爾老鸛草、短嘴老鸛草老鸛草、玄乃草

科　名：牻牛兒苗科(Geraniaceae)

學　名：*Geraniam nepalense* Sweet

生育特徵：多年生草本，匍匐狀，葉對生，葉呈掌狀形，深鋸齒，腋生花，白色，蒴果。

繁殖方法：實生法、扦插繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：生物鹼。

功　效：採全草，為腸收斂劑、止瀉、治腸炎及赤痢、本品與望江南種子合用，持續服用，有懷孕之功。

產　地：台灣、新竹。



土沉香

編　　號：285

別　　名：水賊仔、水賊

科　　名：大戟科(Euphorbiaceae)

學　　名：*Excoecaria agallocha* L

生育特徵：多年生灌木或小喬木，葉互生，卵形至橢圓形。花為短，總狀花序，蒴果，熟時暗褐色。

繁殖方法：扦插繁殖。

利用部位：根。

主要成分：生物鹼。

功　　效：採根為強壯劑，乳汁為腐蝕劑，全株有毒。

產　　地：台灣、新竹。



馬利筋

編　　號：286

別　　名：蓮生桂子花、芳草花、尖尾鳳

科　　名：蘿藦科(Asclepiadaceae)

學　　名：*Asclepias curassavica* L.

生育特徵：多年生草本，有乳汁，葉對生，全緣，狹披針形。繖形花序，頂生，腋生，開紫紅色花，蓇葖果。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：全 草 含 asclepidin，uzarigenin I，coroglaucigenin II，corotoxigenin III．asclepozenin，clepogenin，curassavoogenin 等配糖體。根含 inetoxin，強心配糖體 curassavicin、葉含生物鹼。

功　　效：全草為興奮、祛痰劑、根為催吐、瀉劑、可治癌症。

產　　地：台灣、新竹。

151

編　號：287

半夏

別　名：清半夏、守田、法夏、法半夏
姜半夏、清夏、半下、亦稱三葉半夏

科　名：天南星科(Araceae)

學　名：*Pinellia ternata* (Thunb.) Breit.

生育特徵：多年生小草本，球形塊莖。單葉，卵狀心形，並有三小葉，小葉橢圓形，自莖基部抽出花穗，花苞片，片尖如細針。

繁殖方法：珠芽、塊莖繁殖。

利用部位：地下塊莖。

主要成分：塊莖含揮發油，少量脂肪、澱粉。煙鹼、谷氨酸、精氨酸、味辛、溫、有毒。

功　效：燥熱化痰、降逆止嘔、消痞散結、治肺胃虛弱、好食酸冷寒痰停積、嘔逆噁心、手足逆冷、目眩身重欲吐不吐、治嘔吐、心下痞，膈間有水、眩悸者、治妊娠嘔吐不止、治產後暈絕、外傷性出血。

產　地：中國、台灣

編　號：288

龍牙草

別　名：石打穿、仙鶴草、爪香草
脫力草、黃牛尾、牛尾草、狼牙。

科　名：薔薇科(Rosaceae)

學　名：*Agrimonia pilose* Lodeb.

生育特徵：多年生草本，葉互生，羽狀複葉，小葉卵圓形，有粗鋸齒，花頂生，黃色，總狀花序。

繁殖方法：分株繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：全草含龍牙草苷(agrimonin)。根含agrimonol, agrimonolide,apigenin。

功　效：採全草，味苦、性溫、治婦人月經前後紅崩、白帶、面寒、腹痛、赤白痢疾、婦科止血藥、主治勞咳、吐血、尿血、便血、牙齦出血、崩漏帶下、血痢、兼強心、胃潰瘍出血、子宮出血、痔出血等。

產　地：台灣、新竹。

編　　號：289

假木豆

別　　名：假土豆、千金茇、山豆根
木莢豆、野螞蝗、千金不換籐

科　　名：豆科(Leguminosae)

學　　名：*Dendrolobium triangulare* (Retz.) Schindler

生育特徵：多年生灌木，高 50-150cm，葉互生，三出複葉，小葉倒卵狀短圓形或短圓形，頂生小葉，長 4-10cm，寬 2.5-4cm，花序腋生，白色或淡白色，莢果，花果期 5-11 月。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：根莖及葉。

主要成分：生物鹼。

功　　效：採全草有清熱涼血、利濕健脾、強壯精骨、利尿消腫、治咽喉痛、產後虛弱、小兒疳積、肝炎、尿酸疼痛、風濕骨痛、類風濕痛、癱瘓咯血、內傷出血、跌打骨折。葉治牙痛、腹瀉。

產　　地：中國、印度、錫蘭、馬來西亞、中南半島、台灣。

編　　號：290

千里光

別　　名：蔓皇苑、千里及、千里急
箭草、固脾草

科　　名：菊科(compositae)

學　　名：*Senecio Scandens* Ham.exD.Don.

生育特徵：多年生草本，葉互生，卵狀披針形或橢圓狀三角形，頭狀花序，花黃色，頂生，瘦果。

繁殖方法：實生法繁殖、扦插繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：含大量毛莨黃素、菊黃質、s-胡蘿蔔素、生物鹼、揮發油、黃酮甙、鞣質、酚類。

功　　效：全草味苦、寒、清熱解毒、殺蟲、明目、治風火眼痛、雞盲、癰疽瘡毒、乾溼癬瘡、濕疹日久不愈者、瘧疾、預防中暑、流感、腳趾間濕癢、肛門癢、陰道癢、鵝掌風、頭癬、陰囊皮膚流水奇癢、燙火傷、疥瘡、腫毒。

產　　地：台灣、新竹。

編　　號：291

吉祥草

別　　名：爆仗竹、炮仗紅
　　　　　華燈子、紅長花
科　　名：玄參科(Scrophulariaceae)
學　　名：*Russelia eguisetiformis* Schlechi et champion
生育特徵：灌木，高 50-200cm，輪生狀分枝，葉 3-6 片輪生，卵形或橢圓形，長 1-1.5cm，鋸齒緣，單落性，花聚繖花序，紅色至深紅色，長筒狀，長 1.5-2cm 花果期夏秋間。
繁殖方法：扦插繁殖。
利用部位：全草。
主要成分：生物鹼。
功　　效：採全草，有活血、化瘀、消腫之效，治肝炎、跌打、骨折；炮竹紅之花筒管狀紅色，盛花期時節纍纍著生在細枝上，成串狀似鞭炮，極可愛，固得炮竹紅之名。
產　　地：原產墨西哥以及美洲熱帶地區、大陸福建、廣東、廣西以及台灣。

編　　號：292

旋覆花

別　　名：六月菊、金佛花、小黃花
科　　名：菊科(compositae)
學　　名：*Inula japonica* Thunb
生育特徵：多年生直立草本，葉長橢圓狀披針形或長圓形。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：全草或地上部份。
主要成分：蒲公英甾醇(taraxasterol, inusterol A)，槲皮素、异槲皮素、氯原酸、咖啡酸。
功　　效：治降氣、消痰、行水、止嘔、用于風寒咳嗽、痰致蓄結、胸膈痞滿、嘔吐噫氣。
產　　地：台灣、新竹

翻白草

編　　號：293

別　　名：天清地白、黃花地丁千錘打。

科　　名：薔薇科(Rosaceae)

學　　名：*Potentilla discolor* Bunge

生育特徵：多年生宿根草本，根分生，基生葉叢生，單數羽狀複葉，小葉片長橢圓形或狹橢圓形。聚繖花序，黃花，瘦果，花果期 5-11 月。

繁殖方法：實生法繁殖、分枝繁殖。

利用部位：帶根全草。

主要成分：生物鹼。

功　　效：帶根全草，可治細菌性痢疾、阿米巴痢疾、瀘瘧疾寒熱及無名腫毒、咳嗽、痰喘、崩中下血、創傷出血、血友病、腮腺炎、渾身疥癬。

產　　地：台灣、新竹。

白古蘇花

編　　號：294

別　　名：白木蘇花、蝴蠅翅

科　　名：豆科(Leguminosae)

學　　名：*Dendrolobium umbellatum* (Linn) Bentham

生育特徵：多年生常綠灌木，葉為三出複葉，互生，小葉闊橢圓形。繖形花序，白色，莢果。習生於近海岸處。

繁殖方法：實生法繁殖、扦插繁殖。

利用部位：葉、花。

主要成分：生物鹼。

功　　效：葉略具收斂作用，為產婦藥，花治淋病、月經不順。

產　　地：台灣、新竹。

編　　號：295

非洲蘆薈

別　　名：小號蘆薈
科　　名：百合科(Liliaceae)
學　　名：*Aloe africana* Miller.
生育特徵：多年生草本，葉呈狹披針形，葉緣有鈍刺。花自腋出，抽出花梗，開紅色花，蒴果。
繁殖方法：葉插繁殖。
利用部位：葉、花。
主要成分：蘆薈主含配糖體，即蘆薈苷。
功　　效：性寒、味苦、入肝、脾、胃、大腸回經、為殺虫、通便、消熱、涼肝。
產　　地：非洲、台灣、新竹。

編　　號：296

腎蕨

別　　名：球蕨
科　　名：篠蕨科(Oleanderaceae)
學　　名：*Nephrolepis auriculata* (L.) Trimen
生育特徵：多年生蕨類植物，葉呈羽狀葉，小葉披針形，根生塊莖，葉片生孢子。
繁殖方法：分枝法及孢子繁殖。
利用部位：塊莖。
主要成分：生物鹼。
功　　效：塊莖稱鳳凰蛋、鐵雞蛋、山豬仔王弗、山豬睪丸、山檳榔、治淋巴結核、解熱、五淋白濁、崩帶。
產　　地：台灣、新竹。

月見草

編　　號：297

別　　名：待宵花、月下香

科　　名：柳葉菜科(Oenothraceae)

學　　名：*Oenothera odorata* Jacq

生育特徵：多年生草本，葉披針形或線狀披針形。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：含揮發油。

功　　效：味甘、澀。祛風解熱、強筋骨、治感冒、喉炎、夜盲症。

產　　地：台灣、新竹。

鴨跖草

編　　號：298

別　　名：竹葉草、竹節菜
三角草、鴨仔草
竹仔菜、水竹仔菜

科　　名：鴨跖草科(commelinaceae)

學　　名：*Commelina communis* L.

生育特徵：一年生草本，葉互生，卵狀披針形。總狀花序，花深藍色，蒴果。

繁殖方法：扦插繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：全草含飛燕草苷(delphin)，粘液質，花含藍鴨跖草苷(commelinin)，鴨跖草黃酮苷(flavocommelin)，鴨跖草花色苷(awobanin)等，種子含脂肪油。

功　　效：性寒、味甘、淡、清熱解毒、利水消腫、用于風熱感冒、高熱不退、咽喉腫痛、水腫尿少、熱淋澀痛、痛腫疔疱。

產　　地：台灣、新竹。

編　　號：299

尖尾鳳

別　　名：接骨銅、小駁骨丹
澤蘭、尖尾峰、接骨草
四季花、駁骨草、駁骨消

科　　名：爵床科（Acanthaceae）

學　　名：*Gendarussa vulgaris* Nees

生育特徵：多年生灌木，莖綠色帶紫色，節膨隆，葉對生，長披針形。穗狀花序，頂生，腋生，花乳白粉紅色，蒴果。

繁殖方法：扦插繁殖、分枝繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：生物鹼。

功　　效：莖葉祛瘀生新、消腫止痛、跌打損傷、骨打、風濕骨痛、鮮草治骨折無名腫毒、風濕關節炎、四肢神經痛、月經不調、經痛。

產　　地：台灣、新竹。

編　　號：300

接骨木

別　　名：大葉接骨木、樟木樹

科　　名：忍冬科(Caprifoliaceae)

學　　名：*Sambucus williamsii* Rlance，(*Sambucus. recemosa* L.)

生育特徵：落葉灌木或喬木，葉長圓形、橢圓形。

繁殖方法：扦插繁殖、分枝繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：含生物鹼。

功　　效：全草，味甘、苦、平。祛風利濕、活血止痛、治腎炎水腫、創傷出血、膝瘡、風濕性關節炎、腳腫、筋骨打傷、木及枝治骨折、花為發汗藥、葉及樹皮和花含生物鹼。

產　　地：台灣、新竹。

編　　號：301

水堇

別　　名：堇菜、白犁頭草

科　　名：堇菜科(Violaceae)

學　　名：*Viola arcuata* Bl

生育特徵：生於路旁，山邊草坡上，直立草本，高 15cm，地下莖很短，宿根，葉分基生葉及莖生葉二種，具披針形或條狀披針形之拖葉.葉片皆闊心形或近圓形，深綠色，花細小，粉紅色帶黃，基生或腋生，蒴果，花期 9 月。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：生物鹼。

功　　效：採全草葯用，清熱解毒、治瘡癧、急性乳線炎、結膜炎、跌打腫痛。外用鮮品適量搗爛敷患處。

產　　地：台灣、新竹。

編　　號：302

欒樨

別　　名：臭加錠、鯽魚膽
闊苞菊、鼎蓊門

科　　名：菊科(compositae)

學　　名：*Pluchea indica* (L.) Less

生育特徵：多年生灌木，葉呈橢圓形至倒橢圓形，互生，葉緣淺鋸齒。花為圓錐花序，頂，腋生，開淡紫色花，瘦果。

繁殖方法：扦插繁殖。

利用部位：根莖、葉。

主要成分：含生物鹼。

功　　效：採根治解熱、發汗，治風濕骨痛或腰痛。主治風濕病、坐骨神經痛。

產　　地：台灣、新竹。

編　號：303

玫瑰

別　名：刺玫花、玫瑰花
科　名：薔薇科(Rosaceae)
學　名：*Rosa rugosa Thunb.* (*Rosa naihai* Hara).
生育特徵：多年生灌木，葉呈奇數羽狀複葉，葉橢圓形、橢圓狀倒卵形。莖有刺，花單生，簇生，紫紅色，白色，瘦果。
繁殖方法：空中壓條法。
利用部位：花。
主要成分：含揮發油、香茅醇、牻牛兒醇、橙花醇、丁香油酚、苯乙醇。
功　效：採摘未開放的花蕾,立即烘乾,鮮用,其味甘、微苦澀、理氣解鬱和血散瘀、可治肺病、咳嗽吐血、新久風痺、肝風頭痛、腫毒初起。根做染料。
產　地：台灣、新竹。

編　號：304

菖蒲

別　名：水菖蒲、水劍草白菖蒲
科　名：天南星科(Araceae)
學　名：*Acorus calamus* L.
生育特徵：多年生草本，葉劍形葉，莖三稜。穗狀花序，花黃綠色。
繁殖方法：分枝繁殖。
利用部位：根、莖、葉。
主要成分：生物鹼。
功　效：根莖有化痰、開竅、健脾、利濕、健胃。治癲癇、驚悸健忘、神志不清、濕滯痞脹、泄瀉痢疾、風濕疼痛、癰腫疥瘡。宜氣逐痰，解毒殺蟲。
產　地：台灣、新竹。

編　號：305

糖球

別　名：丁型草、釘頭果
釘錘果、烏頭果

科　名：羅摩科（Asclepiadaceae）

學　名：*Gomphocarpus fruticosus* R.Brown

生育特徵：多年生灌木，多分枝，葉對生或輪生，葉片條狀如柳葉，長披針形。聚繖花序，頂生，腋生，白色花，蓇葖果膨脹，如釘在果面上。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：根、全草。

主要成分：釘錘果苷。

功　效：根含強心苷、釘錘果苷，枝葉含強心苷、香豆素、槲皮素。微降血糖、止癢。

產　地：台灣、新竹。

編　號：306

肝炎草

別　名：靈芝草、白劍草、龍舌癀

科　名：鴨跖草科(commelinaceae)

學　名：*Aneileima keisak* Hassk

生育特徵：一年生肉質植物，葉長披針形。花自腋出，開白花，蒴果。

繁殖方法：分枝繁殖、扦插繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：生物鹼。

功　效：全草，味甘、苦、微酸、性寒、清血利尿、除熱、可清肝熱、肝火、肝炎、治冷熱咳、心臟病、高血壓、肝炎、肝硬化、血癌、無名腫毒、火燙傷（皮膚未破才可）鮮肝炎草適量，搗爛敷患處。

產　地：台灣、新竹。

天門冬

編　號：307

別　名：天冬、大門根

科　名：百合科(Liliaceae)

學　名：*Asparagus cochinchinensis* (Lour.) Merr.

生育特徵：多年生草本，葉鱗狀葉。自葉腋出花梗，開白花，蒴果。

繁殖方法：實生法、塊莖繁殖法。

利用部位：塊根。

主要成分：含多種螺旋甾苷類化合物天冬苷Ⅰ V~V Ⅱ (Asp Ⅰ V~V Ⅱ)，天冬酰胺，瓜氨酸，絲氨酸等近 20 種胺氨基酸，以及低聚糖Ⅰ~VⅡ，并合有 5-甲氧基-甲基糠醛(5-methoxy-methylfurfural)。

功　效：根：性寒、味甘、苦養顏生津、潤肺清心、用于肺燥干咳、虛勞咳嗽、津傷口渴、心煩眠、內熱消渴、腸躁便秘、白喉。

產　地：台灣、新竹。

鐵包金

編　號：308

別　名：小葉黃鱔藤、勾兒茶老鼠耳、烏里乃

科　名：鼠李科(Rhamnaceae)

學　名：*Berchemia lineats* Linn. DC.

生育特徵：多年生藤狀灌木，葉互生，卵形、圓形。花簇生，葉腋小，白色，核果，熟時紫黑色。

繁殖方法：扦插繁殖、實生法繁殖。

利用部位：根莖、葉。

主要成分：生物鹼。

功　效：採根解蛇毒，理惡瘡、跌打傷、駁骨止痛、治小腸氣痛、風濕痛。

產　地：台灣、新竹。

紫檀

編　　號：309

別　　名：心紫檀、赤檀、紅木

科　　名：豆科(Leguminosaee)

學　　名：*Pterocarpus santalinus* L. F.

生育特徵：多年生喬木，葉長橢圓形、橢圓形。莖赤色，總狀花序，腋生，頂生，花黃白色，莢果。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：樹幹。

主要成分：材含紫檀酸(Santalin)。

功　　效：採木材治胃痛、僂麻質斯。

產　　地：台灣、新竹。



輪葉莎草

編　　號：310

科　　名：莎草科(Cyperuaceae)

學　　名：*Cyperus pilosus* Vahl.

生育特徵：多年生草本，具細長地下莖，莖三稜形，高30-90cm，葉較長，莖為短線形。繖形花序，褐色或赤褐色。

繁殖方法：分枝繁殖、實生法繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：生物鹼。

功　　效：全草為清涼退熱用。

產　　地：台灣野生、新竹。

老鸛草

編　　號：311
別　　名：觀筋草、老貫草
　　　　　老貫筋、貫筋咀、貫金
　　　　　貫筋、貫筋草、老鸛
　　　　　太陽花、老鸛筋
　　　　　狼巴巴草、長嘴老貫草
　　　　　老觀草
科　　名：牻牛兒苗科(Geraniaceae)
學　　名：*Erodium stephanianum* Willd.
生育特徵：多年生草本，葉三出葉，每小葉披針形。開白花，蒴果。
繁殖方法：扦插繁殖、實生法繁殖。
利用部位：全草。
主要成分：生物鹼。
功　　效：採全草為收斂止瀉劑。
產　　地：台灣、新竹。

台灣馬兜鈴

編　　號：312
別　　名：天仙藤、黃藤
　　　　　黃陳、木香、青木香
科　　名：馬兜鈴科(Aristolochiaceae)
學　　名：*Aristolochia mollis* Dum.
生育特徵：多年生蔓性草本，葉長橢圓狀、腎形。花腋生，開暗紫色花，蒴果。
繁殖方法：塊莖繁殖。
利用部位：全株。
主要成分：根含馬兜鈴酸(aristolochic acid)。
功　　效：採根，為止痛劑，治腹瀉、毒蛇傷、其能抗癌。
產　　地：台灣、新竹。

編　　號：313

爬森藤

科　　名：夾竹桃科(Apocynaceae)
學　　名：*Parsonia laevigata* (Moon)Alston
生育特徵：多年生灌木，單葉，對生，葉呈卵狀長橢圓形、長橢圓狀披針形。花腋生，黃色，聚繖花序，蒴果。
繁殖方法：扦插繁殖。
利用部位：樹皮、葉。
主要成分：生物鹼。
功　　效：降血壓、強心、解熱、去濕。
產　　地：台灣、新竹。

編　　號：314

日本木瓜

別　　名：和木瓜、貼梗海棠、草木瓜、小木瓜、野木瓜、地梨、倭木瓜、木瓜
科　　名：薔薇科(Rosaceae)
學　　名：*Chaenomeles japonica* (Thumb.)Lindley.
生育特徵：落葉性灌木，下部莖常橫生。枝有棘刺，葉互生，具柄，葉片倒卵形，基部近圓形或狹楔形，先端鈍形，全緣或上半部具細鋸齒緣，兩面無毛。花橙紅色至紅色。果實近球形或廣橢圓形，熟黃。
繁殖方法：扦插繁殖、實生法繁殖。
利用部位：全草。
主要成分：生物鹼。

功　　效：果實有整腸助消化和血化瘀、降血壓、補血、舒筋、鎮痛、止咳、利尿、治霍亂、痢疾、噁心、中暑、風濕痛、筋肌緊張、腳氣、咽喉痛、咳嗽、不眠、高血壓。
產　　地：日本、中國、台灣、新竹。

編　　號：315

芸香

別　　名：臭草、臭芙蓉、心臟草

科　　名：芸香科(Rutaceae)

學　　名：*Ruta graveolens* L.

生育特徵：多年生草本，全株具強烈氣味，葉互生，羽狀複葉，深裂至全裂，裂片卵長圓形、倒卵形、匙形。聚繖花序，頂生，腋生，花金黃色，蒴果。

繁殖方法：扦插繁殖、實生法繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：生物鹼。

功　　效：採全草，興奮、鎮靜、通經、治風濕病、高血壓、月經不調。

產　　地：台灣、新竹。

編　　號：316

北美一枝黃花

別　　名：柳枝黃

科　　名：菊科(Compositae)

學　　名：*Solidago virga*-aurea L. var. *leiocapa* (Benth)A. Gray.

生育特徵：多年生草本，莖直立，根生葉卵圓形、長橢圓形或披針形，莖生葉，長橢圓形，葉緣鋸齒。頭狀花序，花黃色，瘦果。

繁殖方法：分枝繁殖、實生法繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：生物鹼。

功　　效：採全草，治膀胱尿道諸症，產後餘疾、吐血。

產　　地：北美洲、台灣、新竹。

落地生根

編　號：317

別　名：倒吊蓮、燈籠花

科　名：景天科(Crassulaceae)

學　名：*Bryophyllum pinnatum* (Lam.)Kurz.

生育特徵：多年生肉質草本，莖直立，葉對生，單葉或羽狀複葉，小葉橢圓形。聚繖花序，頂生，腋生，花紫紅色，蓇葖果。

繁殖方法：葉插繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：生物鹼。

功　效：全草散風清血、消腫毒、退癀熱、治癰疽熱毒、蜂巢癰疼痛、跌打、蛇傷、風熱、刀傷、水腫、肺炎。

產　地：台灣、新竹。

莪朮

編　號：318

別　名：藍心薑、黑心薑、薑七

科　名：薑科(Zingiberaceae)

學　名：*Curcuma aeruginosa* Roxb.

生育特徵：多年生草本，葉橢圓形或長橢圓狀披針形。

繁殖方法：分枝繁殖。

利用部位：根莖。

主要成分：根莖含揮發油，油中含的成分有莪朮呋喃酮(curzerenone)、表莪朮呋喃酮(epicurzerenone)、莪朮雙酮(curdione)、莪朮醇(curcumol)、樟腦、龍腦等。

功　效：可破血行氣、消積止痛、用於血瘀腹痛、肝脾腫大、血瘀閉經、飲食積滯。

產　地：台灣、新竹。

編　　號：319

蘆莉草

別　　名：三消草、南洋蘆莉草
消渴草、三清草、觀音莧、糖尿草

科　　名：爵床科(Acanthaceae)

學　　名：*Ruellia tuberosa* Linn.

生育特徵：一年生或越年生草本，全株無毛。莖單一或由基部分生或叢生，直立有節，節上膨大，對生短枝上，莖下部圓柱形，上部略四方形。葉對生，長卵形或廣披針形。淡紫色或紫色。蒴果長角形柱狀，熟時綠褐色。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：生物鹼。

功　　效：採全草有利尿、消渴、清熱、解毒、治牙痛、腹痛、感冒、肝病、高血壓、糖尿病、尿毒、外用搗敷治瘍痛、潰瘡、刀傷。

產　　地：寮國、泰國等東南亞熱帶地區、台灣、新竹。

編　　號：320

蔓草蟲豆

別　　名：豆子草、蔓蟲豆

科　　名：豆科(Leguminosae)

學　　名：*Atylosia scarabaeoides* (L.) Benth.

生育特徵：多年生木質小藤本，葉互生，三出複葉，頂生，小葉菱狀卵形。總狀花序，腋生，花黃白色，莢果。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：生物鹼。

功　　效：採全草消炎利尿，治尿毒病。

產　　地：台灣、新竹。

編　號：321

石莧

別　名：過江藤、鴨舌黃
鴨嘴蓖黃、鴨嘴黃
黨殼刺

科　名：馬鞭草科(Verbenaceae)
學　名：*Phyla nodiflora* (L.) Greene.
生育特徵：多年生草本，莖匍匐地上。葉對生，倒卵形、匙形。花序梗直立，粉紅色花，蒴果。
繁殖方法：扦插繁殖、實生法繁殖。
利用部位：全草。
主要成分：生物鹼。
功　效：採全草，為婦科藥、治月經不調、經閉、白帶、淋病、腫毒。
產　地：台灣、新竹。

編　號：322

單葉蔓荊

別　名：蔓荊、海埔姜、白埔姜
蔓荊子、萬荊子、黃荊子
荊條、荊子、山埔姜

科　名：馬鞭草科(Verbenaceae)
學　名：*Vitex rotundifolia* L.
生育特徵：多年生落葉灌木，單葉對生，葉片卵形、倒卵形。圓錐花序，頂生，淡紫色漿果。
繁殖方法：扦插繁殖、實生法繁殖。
利用部位：根莖及種子。
主要成分：生物鹼。
功　效：果為解熱、強壯、清涼藥、治感冒、頭痛、果、葉含黃酮(vitexicarpin)、紫花牡荊素(casticin)。
產　地：台灣、新竹。

編　　號：323

泰國益母草

別　　名：益母、益母艾、紅花艾
　　　　　紅花益母草、坤草

科　　名：唇形科(Labiatae)

學　　名：*Leonurus heteropyllus* sweet.

生育特徵：一年生或二年生草本，莖四方形，葉片呈近圓形或心形，莖上葉對生，花粉紅色至紫紅色。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：生物鹼。

功　　效：全草有活血調經、利尿消腫、去瘀生新。治月經閉、月經疼痛、月經不調、產後惡露或出血過多、夜盲症、結膜炎、咽喉腫痛、動脈硬化症、高血壓、腎炎水腫、尿血、小便不利。果實(茺蔚子)有活血調經、益精明目、疏風清熱、補益腎陰、子宮收縮、下死胎之效。

產　　地：亞洲、歐洲地區、台灣、新竹。

編　　號：324

枸杞

別　　名：枸繼子、枸棘子
　　　　　甜菜子、地仙花、枸杞菜
　　　　　土杞子、枸杞子
　　　　　土枸杞、狗奶子

科　　名：茄科(solanaceae)

學　　名：*Lycium chinense* Miller.

生育特徵：多年生灌木植物，葉呈橢圓形至卵形，莖枝有刺，花腋生，開紫色花，結漿果，熟時紅色。

繁殖方法：扦插繁殖、實生法繁殖。

利用部位：全株。

主要成分：生物鹼。

功　　效：採果實強壯劑。治糖尿病、肺結咳、止咳、解渴。根皮全年可採，以清明前採為佳，用鐵錘將根撬破，剝下晒乾，稱地骨皮、枸杞根皮、地骨皮為強壯解熱藥。採枝葉，為解熱、止渴、腫脹、眼疾。採根及幹為解毒、消炎、治風濕。

產　　地：台灣、新竹。

編　　號：325

黃蜀葵

別　　名：黃秋葵、野芙蓉
角豆、秋葵
食用秋葵、倭克拉
科　　名：錦葵科(Malvaceae)
學　　名：*Abelmoschus manihot* (L.) Medic.
生育特徵：一年生草本，葉卵形至近圓形，花腋生，黃花，結果莢。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：根、莖、果及花。
主要成分：花含花青素類色素，根含黏液質。

功　　效：夏天採花，秋天採果實及根曬乾備用。味甘、苦、寒、清熱解毒、潤燥滑腸。子可治小便不通、催生、花治小兒口瘡。根治淋病、消瘡排膿、痔瘡、肺熱咳嗽、通乳。根、莖治氣血虛。鮮黃葵葉治燒燙傷，孕婦忌服。
產　　地：台灣、新竹。

編　　號：326

紅田烏

別　　名：田邊草、蓮子草
滿天星、紅田烏草
旱蓮草、紅花密菜
田烏草、紅骨擦鼻草
耐驚菜、田邊草
紅花墨菜、蟛蜞菊
科　　名：莧科(Amaranthaceae)
學　　名：*Alternanthera sessilis* (L.) R. Brown.
生育特徵：一年生草本，全株紫紅色或淡綠色。葉對生，橢圓狀披針形、披針形。頭狀花序，腋生，花紅色，胞果。
繁殖方法：扦插繁殖、實生法繁殖。
利用部位：葉。
主要成分：生物鹼。

功　　效：採葉暗紅色品種者，煎服治腎臟病、痢疾、憂鬱症及吐血。
產　　地：台灣、新竹。

編　號：327

日本薄荷

別　名：薄荷
科　名：唇形科(Labiatae)
學　名：*Mentha arvensis* L. var *piperascens* Malinv.
生育特徵：多年生宿根草本，葉橢圓形。花腋生，開白花，蒴果。
繁殖方法：扦插繁殖、分枝繁殖。
利用部位：全草。
主要成分：精油。
功　效：採鮮草製精油，薄荷油為芳香性矯味、健胃、發汗、祛風劑。治胃腸異常發酵、疝痛、下痢、鎮痙、神經末稍麻痺，並治胃潰瘍、胃痙攣、吐瀉、子宮痙攣、神經痛等。其葉具有利胆作用，亦有提神作用。
產　地：日本、中國、台灣、新竹。

編　號：328

黃葉地瓜

別　名：甘薯、地瓜
科　名：旋花科(Convolvulaceae)
學　名：*Ipomoea batatas* Lam var.*edulis* Makino.
生育特徵：多年生草質藤本，匍匐性塊根，白、紅、黃色。單葉，互生，闊卵形、心狀卵形。聚繖花序，花紅紫色或白色，蒴果。
繁殖方法：扦插繁殖、塊莖繁殖。
利用部位：塊莖及全草。
主要成分：生物鹼。
功　效：採塊莖健脾胃，強腎陰。採全草可做飼料，野菜及有關加工品。
產　地：台灣、新竹。

編　號：329

紅骨魚腥草

別　名：魚腥草、臭臊草、臭瘥草
　　　　狗杏米根、手藥、魚瘥草
　　　　魚臊草、蕺、狗貼耳。

科　名：三白草科(Saururaceae)

學　名：*Houttuynia cordata* Thunb.

生育特徵：多年生宿根草本，全株有魚腥味。葉互生，
　　　　心形。穗狀花序，淡黃紅色，蒴果。

繁殖方法：扦插繁殖、分枝繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：生物鹼。

功　效：係由一般之魚腥草中分出來。採全草，散熱、
　　　　消腫、利尿、解毒、治淋病、尿道炎、梅毒、
　　　　水腫、子宮炎、胃癌、肺癰吐膿血、久虐等。
　　　　對化膿病、中耳炎、肺膿瘍等，有排膿解毒之
　　　　功效；又可預防及治療狹心症絞痛發作外敷瘡腫、癬疹、痔瘡、香港腳、濕疹。

產　地：台灣、新竹。

編　號：330

馬蘭

別　名：開脾草、雞兒腸

科　名：菊科(Compositae)

學　名：*Aster indicus* L.

生育特徵：多年生草本，葉長披針形。花
　　　　頂生，腋生，紫黃色花，蒴
　　　　果。

繁殖方法：扦插繁殖、實生法繁殖。

利用部位：全草、根、葉。

主要成分：生物鹼、精油。

功　效：採葉，含精油，葉止血、解
　　　　毒。涼血清熱、利濕解毒。治
　　　　吐血、衄血、血痢、創傷出
　　　　血、瘧疾、黃疸、水腫、淋
　　　　濁、咽痛、喉痺、痔瘡、癰
　　　　腫、丹毒、蛇咬傷。

產　地：台灣、新竹

編　號：331

烏斂莓

別　名：五爪龍、五爪絨
科　名：葡萄科(Vitaceae)
學　名：*Cayratia japonica* (Thunb.) Gagnep.
生育特徵：多年生蔓性草本，莖紫綠色，葉掌狀複葉，具五小葉，小葉橢圓形。聚繖花序，腋生，花小，黃綠色，漿果，熟時黑色。
繁殖方法：扦插繁殖、實生法繁殖。
利用部位：全草。
主要成分：生物鹼。
功　效：採全草，清涼解毒、敷腫毒。苗消腫藥。
產　地：台灣、新竹。

編　號：332

假川牛膝

別　名：假牛膝、台灣蒽草
科　名：莧科(Amaranthaceae)
學　名：*Cyathula prostrate* (Linnaeus) Blume.
生育特徵：多年生草本，莖近似四稜形，葉對生，橢圓形、卵狀矩圓形至近菱形。總狀花序，頂生，腋生，黃白色，胞果。花果期 8-12 月。生於平野草地，山路旁。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：全草。
主要成分：生物鹼。
功　效：採收全草，地上部味苦、性涼、有清熱解毒、活血散瘀之效、治癰瘡腫毒、毒蛇傷、跌打瘀傷，根：味苦、性涼、有清腸利濕之效、治痢疾。
產　地：台灣、新竹

野薄荷

編　號：333

別　名：薄荷

科　名：唇形科(Labiatae)

學　名：*Mentha arvensis* Linn. var.*piperascen*s Holmes.

生育特徵：多年生草本，莖方形，直立，高 20-50cm，略披軟毛。葉對生，長圓形或長圓狀披針形，果為多果，扁圓形，花期 8-10 月。

繁殖方法：扦插繁殖、分枝繁殖。

利用部位：採全草。

主要成分：生物鹼。

功　效：採全草，有解表、理氣、化濕、利尿、祛痰、活血、化瘀、止痛、治傷風感冒、胸隔脹滿、嘔吐、皮膚濕熱、小兒疳積、黃疸、水腫、皮膚瘙癢、崩漏、白帶。

產　地：大陸南部、日本、韓國、台灣、新竹。

三點金草

編　號：334

別　名：蝴蠅翼、蠅翅草、扁蓄胡蠅翅、珠仔草三耳草、四季春

科　名：豆科(Leguminosae)

學　名：*Desmodium triflorum* (L.) DC.

生育特徵：多年生草本，葉互生，三出複葉，小葉倒心形或倒卵形。花紫紅色，腋生，莢果。

繁殖方法：扦插繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：β—苯乙胺、甜菜鹼、膽鹼。

功　效：全草，夏秋採收晒乾，治婦女經風、肝炎、痢疾、吐血。鮮品治失眠、黃疸、解熱、淋病、小兒咳嗽、治創傷及膿腫不收口。

產　地：台灣、新竹。

編　　號：335

雷公根

別　　名：蛞殼草、蚋仔草
老公根、崩大碗、積雪草

科　　名：繖形科(Umbelliferae)

學　　名：*Centella asiatica* (Linn.) Urban.

生育特徵：多年生草本，匍匐，單葉互生，腎形或近圓形。繖形花序，花紫紅色，葉腋生，雙懸果。

繁殖方法：扦插繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：生物鹼。

功　　效：全草治腹痛、痢疾、青盲內障、高血壓、跌打損傷。莖葉治疔、解毒、固腸、明目、清暑、白濁、毒蛇傷、疔。對結核菌及痲瘋有抗生作用。

產　　地：台灣、新竹。

編　　號：336

銳葉小槐花

別　　名：小槐花、磨仔草、味噲草
金腰帶、魚鱗抹草
拿身草、抹草。

科　　名：豆科(Leguminosae)

學　　名：*Desmodium caudatum* DC.

生育特徵：多年生草本，三出複葉，小葉披針形或闊披針形。總狀花序，微紅白色花，莢果，生細鉤毛。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：生物鹼。

功　　效：採莖葉治吐血、衄血、癰腫、腹痛、有毒。其根為眼藥，並消炎、散血、解毒。主治癰疽、肺癰、膚癢、胃病。

產　　地：台灣、新竹。

編　　號：337

紅葉鴨跖草

別　　名：紫錦草、紫露草
　　　　　紫鴨跖草

科　　名：鴨跖草科
　　　　　(Commelinaceae)

學　　名：*Setcresea purpurea* Boon.

生育特徵：多年生草本，全株紫紅色，葉互生，葉片線狀披針形、狹披針形。花腋生，單出，淡紫紅至淡紫色，蒴果。

繁殖方法：扦插繁殖、實生法繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：生物鹼。

功　　效：採全草，治肝炎、肺炎、吐血、瘀血、丹毒、疔瘡、腫毒、火傷。

產　　地：台灣、新竹。

編　　號：338

鳳仙花

別　　名：鳳仙、急性子
　　　　　巨性子、鳳仙子、指甲花

科　　名：鳳仙科(Baisaminaceae)

學　　名：*Impatiens balsamina* L.

生育特徵：一年生草本，莖直立，葉互生，披針形，花腋生，有白、粉紅、紅、紅紫色。蒴果，熟時五裂，種子急速彈出，故稱急性子。

繁殖方法：實生繁殖法。

利用部位：全草。

主要成分：生物鹼。

功　　效：全草入藥，花為血清，治胸病。莖治癱瘓、透骨搜風、洗腫毒、追風透骨。搗莖取汁，沖黃酒服，治跌打。種子為解毒藥，有通經、催生之功、治月經困難、月經閉止、祛痰。

產　　地：中國、台灣、新竹。

編　　號：339

冬珊瑚

別　　名：瑪瑙珠、毛冬珊瑚
　　　　　玉珊瑚
科　　名：茄科(Solanaceae)
學　　名：*Solanum capsicastrum* Link.ex Schauer.
生育特徵：多年生小灌木，葉互生，葉片卵狀長橢圓形、卵狀披針形。花生葉基，小，白色，漿果。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：全草。
主要成分：生物鹼。
功　　效：採根治跌打損傷。
產　　地：巴西、台灣、新竹。

編　　號：340

柳葉馬鞭草

別　　名：馬鞭草
科　　名：馬鞭草科(Verbenaceae)
學　　名：*Verbena officinalis* Linn.
生育特徵：多年生草本，莖四稜形，單葉，互生，卵形、長橢圓形，羽狀中裂至深裂。穗狀花序，頂生，腋生，淡紫色花，小堅果。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：全草。
主要成分：生物鹼。
功　　效：採全草治月經不通、癥瘕腹脹、下部濕瘡陰腫、久瘧、抗癌。
產　　地：台灣、新竹。

編　號：341

蔓苧麻

別　名：小黏藥、土加藤、紅石薯
捆仙繩、糯米團、糯米草

科　名：蕁麻科(Urticaceae)

學　名：*Memorialis hirta* (Bl.) Wedd.

生育特徵：多年生草本，葉對生，葉片狹卵形，花小，簇生葉腋，淡綠色，瘦果。

繁殖方法：扦插繁殖、實生法繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：生物鹼。

功　效：藥用全草，治消化不良、食積胃痛、小兒疳積、咳血、吐血、痛經、白帶、腸炎、痢疾。外用治血管神經性水腫、癰瘡癤腫、跌打腫痛、外傷出血、外用鮮品搗爛適量敷患處。

產　地：台灣、新竹。

編　號：342

紅芋

別　名：黑脈芋、野芋
鐵芋、檳榔芋

科　名：天南星科(Araceae)

學　名：*Colocasia antiquorum* Schott.

生育特徵：多年生草本，葉卵形。

繁殖方法：塊莖繁殖。

利用部位：塊莖(夏、秋採挖)。

主要成分：塊莖含 s-胡蘿蔔素、鉛。

功　效：味辛、寒、有毒、可止痛消腫、解毒、紅芋塊根和酒槽搗敷患部治乳癰、治黃蜂、蜈蚣咬傷、毒蛇咬傷。宜忌，本產品均為外用不可誤食。

產　地：台灣、新竹。

編　號：343

茵陳蒿

別　名：茵陳、綿茵陳
白蒿、絨蒿、松毛艾
科　名：菊科(Compositae)
學　名：*Artemisia capillaris* Thunb.
生育特徵：多年生草本或半灌木狀，葉線形。花頂生或腋生。穗狀花序，淡白色，蒴果。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：全草。
主要成分：成分含6,7-二甲基七葉樹內酯(6,7-dimethyles-culetin)及揮發油，油中主要為α-蒎烯，茵陳二炔酮(capillin)，茵陳烯炔(capillene)，茵陳醇(capillanol)，茵陳色原酮(capil-larisin)，氯原酸。
功　效：春季幼苗高6-10cm時採收，除去老莖及雜質，可清溼熱、退黃疸、用於黃疸尿少、濕疱瘙癢、傳染性黃疸型肝炎。
產　地：台灣、新竹。

編　號：344

守宮木

別　名：減肥菜、越南菜、樹仔菜
科　名：大戟科(Euphorbiaceae)
學　名：*Sauropus androgynus* Merr.
生育特徵：多年生常綠灌木，葉互生，二列平展，葉片披針形、卵狀披針形、卵形，花生葉腋，深紅色，蒴果。
繁殖方法：扦插繁殖、實生法繁殖。
利用部位：根幹或嫩枝葉。
主要成分：全株含生物鹼。
功　效：曾作減肥食品，後因發生副作用而停用。
產　地：台灣、新竹

編　號：345

決明

別　名：圓決明、圓草決、真草決
草決、大號山土豆
草決明、馬蹄子
決名子、馬蹄決明
咖啡豆

科　名：豆科(Leguminosae)

學　名：*Cassia tora* L.

生育特徵：一年生草本，莖直立，葉互生，羽狀複葉，小葉倒卵形，花腋生，黃色，莢果，種子似馬蹄。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：成熟種子或其根莖。

主要成分：含瀉素。

功　效：採子，為營養強壯利尿藥、治眼疾、習慣性便秘。

產　地：台灣、新竹

編　號：346

小駁骨丹

別　名：紅骨駁骨丹、尖尾鳳
澤蘭、接骨銅、尖尾峰

科　名：爵床科(Acanthaceae)

學　名：*Gendarussa vulgaris* Nees.

生育特徵：灌木，莖節呈藤狀膨大，紫褐色或綠色。葉對生，有短柄，披針形，先端漸尖，花白色或粉紅色，唇形，頂生或腋生的穗狀花序。

繁殖方法：扦插繁殖、實生法繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：生物鹼。

功　效：採全草，祛瘀生新、消腫止痛、治跌打損傷、骨折、風濕骨痛。

產　地：大陸及台灣。

編　號：347

禾雀草

別　名：禾雀舌、午時花、嘴草、毛馬齒莧、日頭紅千雀花。

科　名：馬齒莧科(Portulacaceae)

學　名：*Portulaca pilosa* L.

生育特徵：一年生或二年生草本，葉線狀扁圓形。花頂生，開淡紅色小花，果為藍果。

繁殖方法：扦插繁殖、實生法繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：莖葉含草酸鉀。

功　效：全草治紅白痢、腫毒，亦供食用。

產　地：台灣、新竹。

編　號：348

黃槿

別　名：粿葉、粿實、炮仔樹

科　名：錦葵科(Malvaceae)

學　名：*Hibiscus tiliaceus* L.

生育特徵：長綠灌木或小喬木，高約10cm，葉互生，近圓形，花頂生或腋生聚繖花序，黃色，花期6-7月。

繁殖方法：扦插繁殖、實生法繁殖。

利用部位：全株

主要成分：生物鹼。

功　效：採葉、樹皮、花清熱、解毒、止咳、嫩枝葉可供蔬食、根有催吐作用。

產　地：大陸南部、台灣。

編　號：349

柴胡

別　名：北柴胡、竹葉柴胡

科　名：繖形科(Umbelliferae)

學　名：*Bupleurum chinense* Dc.

生育特徵：多年生草本，葉倒披針形或狹橢圓形。繖形花序，花黃色，結蒴果。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：根。

主要成分：含柴胡皂苷a.c.d(saikosaponin a,c,d)，並含菠甾醇(spinasterol)，豆甾醇(stigmasterol)$\triangle^{22-}$豆甾烯醇($\triangle^{22-}$stigmastenol)，福壽草醇(adonilol)及少量揮發油。

功　效：春秋季採挖根，晒乾，生用或醋制用，其可疏散退熱，升阻舒肝，用于感冒發熱、寒熱往來、瘧疾、肝郁氣滯、胸肋脹痛、脫肛、子宮脫垂、月經不調。

產　地：中國、台灣

編　號：350

長穗馬蘭

別　名：馬蘭、大青葉、板藍根
南板藍、藍靛葉、山藍
山青、大青

科　名：爵床科(Acanthaceae)

學　名：*Strobilanthes cusia* (Nees) O. kuntze

生育特徵：多年生直立草本，株高 30-70cm.，葉對生，橢圓狀矩圓形，葉長 7-20cm，花大，淡紫色，生枝頭，花序穗狀，長達 5cm，蒴果。

繁殖方法：扦插繁殖、實生法繁殖。

利用部位：根莖、葉。

主要成分：生物鹼。

功　效：採全草清熱解毒、抗病毒、涼血、外用治腮腺炎、慢性濕疹、接觸性皮炎等。

產　地：台灣、新竹

編　號：351

廣霍香



別　　名：到手香、倒手香、左手香
海南霍香、枝香、正香
肇慶香、祿步香。

科　　名：唇形科(Labiatae)

學　　名：*Pogostemon cablin* (Blanco) Benth.

生育特徵：多年生草本，葉對生，葉卵圓形、廣卵形。穗狀花序，頂生，腋生，淡紫色花，小堅果。

繁殖方法：扦插繁殖、實生法繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：葉含精油3-5%為香料原料。

功　　效：採全草，為發表、和中、行氣、化濕、解暑。主治夏秋傷暑濕、寒熱頭痛、胸腹滿悶、嘔吐瀉泄。

產　　地：中國、台灣、新竹。

編　號：352

吊蘭

別　　名：硬葉吊蘭

科　　名：百合科(Liliaceae)

學　　名：*Chlorophytum capense* (L.) Ktze

生育特徵：多年生草本，根莖斜生，橫生，葉自根莖叢生，葉線形、長披針形。花莖細長，近頂有形成葉末的幼小植株，花白色，總狀花序，蒴果。

繁殖方法：分枝繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：生物鹼。

功　　效：採集全草，可清熱、祛瘀、消腫、解毒、治吐血、跌打腫痛。葉搗爛，用酒炒熱敷患處。根治跌打損傷，肺熱咳嗽。全草洗淨，合糯米飯加鹽少許搗爛，敷患處治風毒結瘤不散。

產　　地：台灣、新竹。

苦艾

編　號：353
別　名：艾、艾葉、艾頭。
科　名：菊科(Compositae)
學　名：*Artemisia vulgaris* L.var. *indica* Maxim.
生育特徵：多年生草本，葉互生，羽狀分裂，花生頂及腋間，淡黃色。頭狀花序，瘦果。
繁殖方法：分枝繁殖、實生法繁殖。
利用部位：全草。
主要成分：葉含精油 0.02%。
功　效：採嫩枝葉，治腹痛、吐血、止血、採根及幹，治頭痛。
產　地：台灣、新竹。

蔓榕

編　號：354
別　名：變葉薜荔、狹葉蔓榕濱榕
科　名：桑科(moraceae)
學　名：*Ficus tannoensis* Hayata
生育特徵：多年生常綠蔓性灌木，單葉，互生，葉呈線形、披針形、菱形，隱花果。
繁殖方法：扦插繁殖。
利用部位：根葉。
主要成分：生物鹼。
功　效：採根葉，治跌打、解熱。
產　地：蘭嶼、台灣、新竹。



編　號：355

朴地菊

別　名：金挖耳草、金挖耳、勞傷草
挖耳草、野煙、鐵骨消
野葵花、煙管草、山煙筒頭

科　名：菊科(Compositae)

學　名：*Carpesium divaricatum* Sieber et Zuccariri

生育特徵：多年生草本，全株被白色毛，莖直立，上部分枝。葉互生，卵形或卵狀矩圓形，頭狀花序，黃色，管狀花，蒴果。

繁殖方法：扦插繁殖、實生法繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：生物鹼。

功　效：採全草，清熱解毒、祛風消瘀、殺蟲之效。治感冒、頭痛、風火毒眼、眼疾、目黃、腮腺炎、咽喉腫痛、淋巴結炎、腹痛、胃腸炎、下痢、痔瘡出血、癰瘡腫毒。

產　地：中國大陸、朝鮮、日本及琉球等地，台灣北部山區亦有分佈。

編　號：356

三葉葡萄

別　名：三腳鱉、三腳虎
三腳藤、三腳別

科　名：葡萄科(Vieaceae)

學　名：*Tetrastigma alatum* Li
(*Vitis shifunensis* Hay.)

生育特徵：多年生蔓性藤木，葉三初葉，小葉披針形或長卵形。聚繖花序，腋生，花密生，白色、乳黃色、粉紅色，果球形，熟時橙色。

繁殖方法：扦插繁殖、實生法繁殖。

利用部位：根、莖、葉。

主要成分：生物鹼。

功　效：根可治瘰瀝，全草治小兒臭頭、疔瘡、鮮葉治蛇頭疔。可消炎、消腫、治瘤疽、頸淋巴腺、結咳。全草外用，治甲邊疔、蛇頭。

產　地：台灣、新竹

美國薄荷

編　號：357

別　名：洋薄荷

科　名：唇形科(Labiatae)

學　名：*Mentha piperita* L.

生育特徵：多年生草本，葉呈橢圓形，花腋生，開唇形花，白色，蒴果。

繁殖方法：扦插繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：含精油 1~1.5 %。

功　效：葉為矯味，矯臭藥。全草為健胃、祛風、發汗劑、治腸異常發酵、疝痛、下痢。外用神經痛。

產　地：美國、歐洲、台灣。

山麻

編　號：358

別　名：山黃麻、山羊麻
山王麻、山亞麻

科　名：榆科(Ulmaceae)

學　名：*Trema orientalis* (L.) B1.

生育特徵：多年生，半落葉性小喬木，葉互生，葉片卵狀長橢圓形、卵狀廣披針形。聚繖花序，腋生，黃綠色花，核果熟時黑色。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：根皮、葉。

主要成分：生物鹼。

功　效：採根止血、止痛、治腹痛、血尿。

產　地：台灣、新竹。

編　號：359

日本芫荽

別　名：日本香菜、假芫茜
刺芫荽

科　名：繖形科(Umbelliferae)

學　名：*Eryngium foetidium* L.

生育特徵：多年生，草本，基生葉，倒披針形，花莖直立，花小，白色，繖形花序，果小。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：含精油。

功　效：採全草治心臟無力、根為健胃劑。

產　地：日本、台灣、新竹

編　號：360

魚針草

別　名：臭天黃、金劍草、菜草頭
蝨母頭、抹草、魚尖草
客人茉草。

科　名：唇形科(Labiatae)

學　名：*Anisomeles indica* O.kuntze.

生育特徵：一年生或越年生，草本，葉對生，葉片卵形至闊卵形。總狀花序，粉紅色，小堅果，黑褐色。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：全草

主要成分：生物鹼。

功　效：採全草為健胃、解熱、驅風。主治傷食、霍亂、感冒。

產　地：台灣、新竹

對葉草

編　號：361

別　名：對葉蓮、有米草
河乳豆草、菁芳草
荷蘭豆草、水藍清
水冰片、穿線蛇

科　名：石竹科(caryophyllaceae)

學　名：*Drymaria cordata* (L.) willd

生育特徵：一年生草本，葉對生，心形。開綠白色小花，蒴果。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：生物鹼。

功　效：採全草治毒蛇咬傷、頭痛、解小兒胎毒。

產　地：台灣、新竹。

台灣八角

編　號：362

別　名：八角仔、紅八角、八角、紅花八角

科　名：八角茴香科(Illiciaceae)

學　名：*Illicium philippinense* Merr.

生育特徵：為多年生常綠小喬木，葉互生，橢圓形兩端銳。花頂生，淡黃白色，蓇葖果。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：根、果

主要成分：精油。

功　效：果為芳香健胃劑。

產　地：台灣

蘭香草

編　　號：363

別　　名：九層樓、走馬風、婆絨花
七層塔、山由茶、山薄荷
千金不換、千搥草、十一層

科　　名：馬鞭草科(Verbenaceae)

學　　名：*Caryopteris incana* (Thunb)Miq.

生育特徵：多年生直立灌木，葉卵形或卵狀矩圓形。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：全草晒乾。

主要成分：生物鹼。

功　　效：可祛風除濕、止咳散瘀、全草治感冒發熱、風濕骨痛、跌打腫痛。蘭香草搗敷患處，治濕疹、皮膚搔癢。鮮草搗汁外塗或煎水洗患處，治感冒頭痛、咽喉痛、百日咳、慢性氣管、氣滯胃痛根治崩漏、白帶、月經不調、癧腫、風濕、強筋骨。

產　　地：台灣、新竹

黃花蔓陀羅

編　　號：364

別　　名：蔓陀羅

科　　名：茄科(Solanaceae)

學　　名：*Datura stammonium.*

生育特徵：一年生，葉麝香味，花亦有白花或紫花，花喇叭狀，氣味獨特，蒴果上有尖刺。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：花、葉。

主要成分：東莨菪鹼。

功　　效：採葉治哮喘性痙攣及唾液分泌過多。花治牙痛，亦是麻醉藥。花和根外敷治風濕病，為可預防暈車。其本身有毒。

產　　地：台灣、新竹

穗花山奈

編　號：365

別　名：白蝴蝶花、立芨、薑花、蝴蝶薑、野薑花、山奈。

科　名：薑科(Zingiberaceae)

學　名：*Hedychium coronarium* Koen.

生育特徵：多年生草本，葉片長橢圓狀披針形、披針形。穗狀花序，淡黃白色，蒴果。

繁殖方法：塊莖繁殖。

利用部位：根莖、花。

主要成分：生物鹼。

功　效：花治失眠。根莖除風散寒、解表發汗。治頭痛、身痛、風濕筋骨痛及跌打損傷。

產　地：台灣、新竹

牡蒿

編　號：366

別　名：臭艾、蔚、土柴胡

科　名：菊科(Compositae)

學　名：*Artemisia japonica* Thunb.

生育特徵：多年生草本，葉羽狀 3 裂，葉互生，頭狀花序，花綠白色，蒴果。

繁殖方法：實生法繁殖、分枝繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：揮發油、中含王古王巴烯、乙酸金合歡醇酯。

功　效：全草治婦人血崩、喉蛾、疥瘡、濕疹、扁桃腺炎、治肺結核、高燒不退、根治過敏性鼻炎。草可用於表、清熱、殺蟲。

產　地：台灣、新竹

編　號：367

菝葜

別　名：鱉殼刺、鱉殼藤
狗骨刺、金剛藤

科　名：百合科(Liliaceae)

學　名：*Smilax china* L.

生育特徵：多年生攀援狀植物，葉圓形，根莖橫走，葉互生。繖形花序，腋生，花單性，漿果，紅色。

繁殖方法：塊莖繁殖。

利用部位：根莖。

主要成分：薯蕷皂甙元。

功　效：塊莖研末治多尿、滑數不禁。根治乳糜尿、赤白痢、食道癌、糖尿病、筋骨酸痛、腰扭傷、而拔葜晒乾，浸酒可治筋骨麻木。

產　地：台灣、新竹。

編　號：368

白花曼陀羅

別　名：白曼陀羅、南洋金花
曼陀羅花、山茄子、洋金花
鳳茄花、鬧洋花、保險子
鬪羊花、大顛茄、風茄花、萬桃花

科　名：茄科(Solanaceae)

學　名：*Datura metel* L.

生育特徵：一年生或越年生草本，葉互生，葉卵形、長卵形、心形，單生花，葉腋，小枝上，白花，果上短刺，蒴果。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：花。

主要成分：生物鹼。

功　效：採花，為雲南白藥之主藥。其花味辛、性溫、有大毒，解止痛，通關利竅，解安眠，癲狂症服之有效。麻醉、風濕、平喘咳、為鎮咳、鎮痛、催眠藥、內服止一切疼痛、治哮喘。葉搗敷止痛、治風濕痛、寒濕腳氣、又可作烟吸治哮喘、劇烈咳喘。採種子，行血、祛風寒、濕脾、瘰癧腫脹、撲損疼痛。

產　地：印度、中國、台灣。

編　　號：369

乳仔草

別　　名：小飛揚草、百里香葉大戟
　　　　　萹蓄、小本乳仔草、結尾仔草
　　　　　乳草、萹蓄草、紅乳草、翻魂
　　　　　乳仔草、烏仔目草、過路蜈蚣
　　　　　扁章、紅骨細葉乳仔草。

科　　名：大戟科(Euphorbiaceae)

學　　名：*Euphorbia thymifolia* L.

生育特徵：一年生草本，莖匍匐，葉小，對生，短圓形、倒卵形。杯狀花序，花小，單生，葉腋，蒴果。

繁殖方法：實生法繁殖、扦插繁殖。

利用部位：全草。

主要成分：生物鹼。

功　　效：採全草，治小兒爛頭瘍、瘡滿耳目、膿水淋漓、腫毒、消炎收斂。主治腸炎痢疾。

產　　地：台灣、新竹。

編　　號：370

白花蔥蘭

別　　名：玉簾、蔥蘭、白菖莆
　　　　　蔥葉水仙、白玉簾
　　　　　蔥蓮、肝風草

科　　名：石蒜科(Amaryllidaceae)

學　　名：*Zephyranthes candida* Herb.

生育特徵：多年生草本，葉數枚束生，線形。花單生花莖上，白色，蒴果。

繁殖方法：實生法繁殖、分枝繁殖。

利用部位：全草及鱗莖。

主要成分：鱗莖含有數種生物鹼。

功　　效：採鱗莖敷蛇傷、癰瘡。

產　　地：台灣、新竹

馬鞭草

編　　號：371
別　　名：鐵釣竿、茶米草
　　　　　鐵馬鞭、狗牙草
科　　名：馬鞭草科(verbenaceae)
學　　名：*Verbena officinalis* L.
生育特徵：多年生草本，葉對生，卵圓形三裂，裂片不規則羽狀分裂。穗狀花序，頂生，腋生，狹長如鞭，花淡紫色，蒴果。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：全草。
主要成分：含馬鞭草苷及馬鞭草醇。
功　　效：採全草，味苦、性微寒、破血、殺蟲。主治月經不通、癥瘕腹脹、下部濕瘡陰腫、久瘧、能促進分娩後胎盤之剝離及產後排泄物之排洩。
產　　地：台灣、新竹

倒地蜈蚣

編　　號：372
別　　名：釘地蜈蚣、過路蜈蚣
　　　　　四角銅鐘
科　　名：玄參科(Scropbulariaceae)
學　　名：*Torenia concolor* Lindley
　　　　　var. *formosana* Yamazaki.
生育特徵：一年生草本，莖匍匐，葉對生，卵形、卵狀心形。總狀花序，單生，花紫色，蒴果。
繁殖方法：實生法繁殖、扦插繁殖。
利用部位：全草。
主要成分：生物鹼。
功　　效：採全草消炎解毒，治中暑、痢疾、火傷、瘡癤、傷風、筋骨痛。
產　　地：台灣、新竹。

鼠尾癀

編　　號：373
別　　名：白花藤、鼠尾紅
小鼠尾黃、麥穗癀、鳳尾黃
小本鼠尾癀、鼠筋黃、爵癀
科　　名：爵床科(Acanthaceae)
學　　名：*Justicia procumbens* L.
生育特徵：一年生草本，莖方形，葉對生，卵形、長橢圓形、廣披針形。穗狀花序，頂生，腋生，花淡紅色，蒴果。
繁殖方法：實生法繁殖、扦插繁殖。
利用部位：全草。
主要成分：生物鹼。
功　　效：採全草，消炎退癀、治喉痛、草搗汁塗腰背酸痛、僂麻質斯。
產　　地：台灣、新竹。

金銀花

編　　號：374
別　　名：銀花、雙花、二寶花
科　　名：忍冬科(Caprifoliaceae)
學　　名：*Lonicera japonica* Thunb
英　　名：Honeysuckle Flower
生育特徵：多年生灌木，葉卵形至長卵形，對生，花為腋生，雙花，初開白色，漸轉金黃色，漿果，熟時黑色。
繁殖方法：扦插繁殖。
利用部位：花及莖。春夏採收花蕾，夏秋採收莖枝，晒乾。
主要成分：揮發油，油中主要為雙花醇、芳樟醇、幷合木犀草素、氯原素、異氯原酸、番木鱉甙(loganin)、肌醇。
功　　效：能清熱解毒，涼散風熱，用于癰腫疔疱、喉痺丹毒、熱血毒痢、風熱感冒、溫病發熱。同屬多種植物的花蕾在不同地區作金銀花藥用忍冬的莖枝亦作藥用，稱忍冬藤，能清熱、解毒、疏風通路。
產　　地：台灣、新竹

編　號：375

白鶴靈芝

別　名：仙鶴草、雲南白藥、癬草。
科　名：爵床科(Acanthaceae)
學　名：*Rhinacanthus nasutus* (Linnaeus)Kurz.
生育特徵：多年生灌木，葉對生，卵形、橢圓形、長圓披針形。聚繖花序，頂生，腋生，開白花，全行如展翅的白鶴，蒴果。
繁殖方法：扦插繁殖。
利用部位：枝、葉或根。
主要成分：生物鹼。
功　效：採枝葉，治早期肺結核、肝炎、胃炎、腸炎、糖尿病、高血壓。
產　地：台灣、新竹

編　號：376

猩猩草

別　名：葉橡花、一品紅火苞草、狀元紅。
科　名：大戟科(Euphorbiaceae)
學　名：*Euphorbia heterophylla* L.
生育特徵：多年生草本，葉互生，卵形、橢圓形、廣披針形、琴形。花序下部小葉變紅色。杯狀花序，花紅色，蒴果。
繁殖方法：扦插繁殖。
利用部位：全草或根。
主要成分：生物鹼。
功　效：採根或全草消腫、止血、調經。治月經過多、跌打損傷、腫毒。
產　地：台灣、新竹。

編　號：377

狐尾武竹

科　　名：百合科(Liliaceae)
學　　名：*Asparagus densiflorus* (kunth) Jessop cv.Myers.
生育特徵：多年生草本，葉由基部抽出，葉片呈羽狀複葉，小葉線形，如狐狸尾。花自葉腋抽出，開淺白色花，漿果，熟時紅色。
繁殖方法：實生法繁殖、分枝繁殖。
利用部位：塊根。
主要成分：生物鹼。
功　　效：消炎退火、觀賞。
產　　地：中國、台灣、新竹。

編　號：378

垂地武竹

別　　名：垂葉武竹
科　　名：百合科(Liliaceae)
學　　名：*Asparagus sprengeri*
生育特徵：多年生草本，葉由根基部抽出，葉片呈羽狀複葉，小葉線形，葉片垂向地面。開淺白色花，漿果。
繁殖方法：實生法繁殖、分枝繁殖。
利用部位：塊根。
主要成分：生物鹼。
功　　效：消炎退火，亦當觀賞及庭院佈置用。
產　　地：中國、台灣、新竹。

編　號：379

文竹

別　名：新娘花
科　名：百合科(Liliaceae)
學　名：*Asparagus setaceus* (kunth) Jessop.
生育特徵：一年生藤蔓草本，葉線形，花自葉腋抽出，開紅色花，結蒴果。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：全草。
主要成分：生物鹼。
功　效：採全草消炎、利尿。治尿道炎、亦為觀賞用。
產　地：中國、台灣、新竹。

編　號：380

松葉武竹



科　名：百合科(Liliaceae)
學　名：*Asparagus myriocladus*
生育特徵：多年生草本，葉似松葉，針線形。花自葉腋出，開白花，蒴果。
繁殖方法：實生法繁殖、分枝繁殖。
利用部位：塊根。
主要成分：生物鹼。
功　效：消炎退火，觀賞及庭院佈置用。
產　地：中國、台灣、新竹。

紫蘇(公館)

編　　號：381
別　　名：紅紫蘇、荏、回回蘇。
科　　名：唇形科(Labiatae)
學　　名：*Perilla frutescens* Britton var. *crispa* Decaisne f. purpurea Makino.
生育特徵：一年生草本，莖鈍四稜形，紫色或綠紫色，葉對生，葉片皺狀卵形、圓卵形、紫色。總狀花序，頂生，腋生，紫色，小堅果，褐色。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：根、莖、葉及果實。
主要成分：葉含精油 0.5%。
功　　效：葉、果為興奮性發汗、鎮靜、鎮咳、鎮痛、利尿劑。
產　　地：公館、新竹。

杭菊

編　　號：382
別　　名：寒菊、甘菊、菊仔、白菊花、杭菊花、甘菊花、滁菊花
科　　名：菊科(Compositae)
學　　名：Chrysanthemum *morifolium* Ramat
生育特徵：多年生草木，葉互生，卵形至披針形，羽狀分裂，邊緣粗鋸齒。頭狀花序，開白花，黃花。
繁殖方法：扦插繁殖。
利用部位：花。
主要成分：生物鹼。
功　　效：採花，祛頭風、目翳、解熱、治頭痛、眩暈、眼科藥、治白內障有效。
產　　地：中國、台灣、銅鑼。

山豆根

編　　號：383

別　　名：台灣山豆根、山橄欖
七葉蓮、青根、青皮虎

科　　名：豆科(Leguminosae)

學　　名：*Euchresta formosana* (Hay.) ohwi.

生育特徵：多年生灌木，葉互生，奇數羽狀複葉，小葉片長橢圓形、倒卵狀長橢圓形。總狀花序，頂生，花白色帶紫色，漿果。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：根、葉。

主要成分：生物鹼。

功　　效：瀉熱、解毒、消腫、止痛。根治毒蛇傷。根及葉均治喉痛。

產　　地：台灣、新竹。



川柴胡

編　　號：384

別　　名：狹葉柴胡、南柴胡
細葉柴胡、軟柴胡。

科　　名：繖形科(Umbelliferae)

學　　名：*Bupleurum scorzonerifolium* willd.

生育特徵：多年生草木，葉呈劍形、線形。繖形花序，開黃色花，瘦果。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：根

主要成分：含皂素。

功　　效：春秋二季採根，為解熱，鎮痙、鎮痛解毒。治間歇性熱及潮熱、黑水病。

產　　地：中國、台灣。

編　號：385

藁本

別　名：熱河藁本、香藁本、北藁本。
科　名：繖形科(Umbelliferae)
學　名：*Ligusticum jeholense* Nakai et itag
生育特徵：多年生草本，葉羽狀全裂，廣三角形，2-3回三出。複繖形花序，花小，白色，雙懸果。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：莖、根。
主要成分：同屬植物藁本L.sinense Oliv的根莖亦葯用。成分含揮發油。
功　效：春季採挖莖及根，去淨泥土，晒干治祛風、散寒、除濕、止痛。用于風寒感冒、巔頂疼痛、風濕肢節痺痛。
產　地：中國、台灣。

編　號：386

黨蔘

別　名：潞黨参、汶黨蔘、晶黨蔘
科　名：桔梗科(Campanulaceae)
學　名：*Codonopsis pilosula* (Franch.) Nannf.
生育特徵：草質藤本，葉卵形，花單生枝端，黃綠色，蒴果。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：根。
主要成分：苷　內　脂Ⅱ.Ⅲ(atractylenideⅡ.Ⅲ)，烟酸，5-羚基-2-甲氧基吡啶，黨蔘酸、丁香甙、丁香醛、香草酸、以及植物甾醇、三菇類、單醣、多糖等。
功　效：主治補中益氣、健脾生津、用于脾肺虛弱、氣短心悸、食少便溏、四肢倦怠、有滋補強壯、補氣養血之效。大補元氣、和脾解飲、補氣血、養筋脈、專清肺氣。
產　地：中國、台灣

萬能薯

編　　號：387
別　　名：白首烏、萬靈薯
　　　　　白何首烏、萬年薯
　　　　　台灣牛皮消、牛皮消。
科　　名：蘿藦科(Asclepiadaceae)
學　　名：*Cynanchum fomosanum* Hemsl.
生育特徵：多年生宿根蔓性藤本，宿紡錘形，葉互生，葉寬卵圓形。聚繖花序，腋生，白色花，蓇葖果。
繁殖方法：塊莖繁殖。
利用部位：根。
主要成分：生物鹼。
功　　效：採根為咳嗽、強壯、腹脹及利尿。
產　　地：高雄、內門、新竹。

香蕉草

編　　號：388
別　　名：假香蕉、假麻區
科　　名：田麻科(Tiliaceae)
學　　名：*Corchorus acutangulus* Lam.
生育特徵：多年生草本，葉橢圓形、長橢圓形，花由腋生，開黃色小花，結蒴果，似香蕉型。
繁殖方法：實生法繁殖。
利用部位：全草。
主要成分：生物鹼。
功　　效：味淡、性寒。治小兒疳積、傷寒誤下痢不止，謂之漏底，煎水飲立止。亦能消暑、止血、敷瘡、散毒消腫。煎水洗疥癩、痲痘、能散毒。
產　　地：台灣、新竹

編　號：389

板藍根

別　名：藍青、靛葉、蓼藍、菘藍

科　名：十字花科(Cruciferae)

學　名：*Isatis tinctoria* L.

生育特徵：二年生草本，高 2-3 尺，葉互生，第一年只長出根生葉，較大，叢生地面，形如湯匙，葉下部有不整齊波狀圓鋸齒。第二年抽莖，莖生葉披針形，全緣，基部有耳抱在莖上。總狀花序，頂生或腋生，花小黃色，果實長圓形扁平，紫色，有翅。根細長圓形。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：根、葉。

主要成分：生物鹼。

功　效：採根、葉為清熱、涼血、解毒、治喉痛、口瘡丹毒等。

產　地：河北、江蘇、浙江、台灣。

編　號：390

防風

別　名：圓防風、大防風、軟防風

科　名：繖形科(Umbelliferae)

學　名：*Saposhnikovia divaricata* (Turcz.) Schischk.

生育特徵：多年生草本，莖單生，基生葉 2-3 回羽狀分裂，裂片披針形。複繖形花序，花黃色，雙懸果。

繁殖方法：實生法繁殖。

利用部位：根。

主要成分：其花及葉含精油 0.05%。

功　效：採根，對頭痛、頸部強直、遊風、關節痛均有效。

產　地：中國、台灣。